

PolySports™

SGN 150

10 + 18 + 10

(10 + 7.8 + 8.3)

30%

NS-54™

USA/INT	10 + 18 + 10
10.0% Total Nitrogen (N) 7.04% Ammoniacal Nitrogen 2.96% Urea Nitrogen*	
18.0% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate	
10.0% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate	
3.4% Total Sulfur (S) from sulfur	
*2.96% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
CONTAINS NON-PLANT FOOD INGREDIENT Humic Acid (derived from leonardite) 16%	
Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NPK 10 + 18 + 10
10,0% Nitrógeno total (N) 7,0% Nitrógeno amoniacal 3,0% Nitrógeno ureico	
18,0% Pentóxido de difósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	
10,0% Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	
8,5% Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua	
CONTIENE INGREDIENTE NO DERIVADO DE PLANTAS Ácido húmico (derivado de la leonardita) 16%	
Importador para España:	
Dosis de aplicación: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Instrucciones de uso: Aplique 20-30 g/m ² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.	

Italia	CONCIME MINERALE COMPOSTO Concime NPK 10-18-10 con attivatore (estratti umici) ottenuto per miscelazione - START H 10 + 18 + 10
10,0% Totale azoto (N) 7,0% Azoto ammoniacato 3,0% Azoto ureico	
18,0% Fosfato disponibile (P ₂ O ₅) dal fosfato di ammonio	
10,0% Potassa solubile (K ₂ O) dal solfato di potassio	
8,5% Anidride solforica (SO ₃), solubile in acqua	
CONTIENE INGREDIENTI NON FERTILIZZANTI VEGETALI Acido umico (derivato da leonardite) 16%	
Prodotta e confezionata da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)	
Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera, 1 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)	
Distribuito da: EMERALD s.r.l.	
Tassi di applicazione: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Istruzioni per l'uso: 20-30 g/m ² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.	


New Zealand	10 + 7.8 + 8.3
10.0% Total Nitrogen (N) 7.04% Ammoniacal Nitrogen 2.96% Urea Nitrogen*	
7.8% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate	
8.3% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate	
3.4% Total Sulfur (S) from sulfur	
*2.96% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
CONTAINS NON-PLANT FOOD INGREDIENT Humic Acid (derived from leonardite) 16%	
Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Taiwan (R.O.C.)	10 + 18 + 10
10.0% Total Nitrogen (N) 7.04% Ammoniacal Nitrogen 2.96% Urea Nitrogen*	
18.0% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate	
10.0% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate	
3.4% Total Sulfur (S) from sulfur	
*2.96% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
CONTAINS NON-PLANT FOOD INGREDIENT Humic Acid (derived from leonardite) 16%	
Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

België	EC KUNSTMEST NPK KUNSTMEST 10 + 18 + 10
10,0% totaal stikstof (N) 7,0% ammoniakstikstof 3,0% ureumstikstof	
18,0% fosfortenoxide (P ₂ O ₅), in water oplosbaar	
10,0% kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar	
8,5% zwaveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar	
BEVAT INGREDIËNT DIE ZELF GEEN PLANTENVOEDING IS Humuszuur (gewonnen uit Leonardiet) 16%	
Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen - België	
Aan te brengen hoeveelheden: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 20-30 g/m ² . Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.	

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NPK 10 + 18 + 10
10,0 % Azote totale (N) 7,0 % Azote ammoniacale 3,0 % Azote uréique	
18,0 % Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	
10,0 % Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	
8,5 % Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau	
NE CONTIENT AUCUN INGRÉDIENT ALIMENTAIRE NON VÉGÉTAL Acide humique (dérivé de leonardite) 16 %	
Importation en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen - Belgique	
Taux d'application : 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 20-30 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25 °C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25 °C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeurs propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeurs.	

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	10 + 18 + 10
10,0% Ολικό άζωτο (N) 7,04% Αμμωνιακό άζωτο 2,96% Άζωτο ουρίας*	
18,0% Διαθέσιμο φωσφορούχα (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο	
10,0% Διαλυτή Ποτάσα (K ₂ O) από το θειικό κάλιο	
3,4% Ολικό θείο (S) από θείο	
*2.96% βραδέως διαθέσιμο άζωτο από πολυμερές με επικάλυψη ουρίας	

		Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
Model 2000 & 2000 SR (cone 6) - Settings for single pass application = FULL RATE		5 km/hr	3.0 m	20 g/m²	25 g/m²	30 g/m²	
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern III-C) - Settings for single pass application = FULL RATE		7 km/hr	9.7 m	L 3/4	N	O	
Vicon (03 Series) - Settings for single pass application = FULL RATE		7 km/hr	8.5 m	5 1/2	6	6 1/2	
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.							

ΠΕΡΙΕΧΕΙ συστατικό τροφίμων μη φυτικής προέλευσης
Χουμικό οξύ (προέλευσης Leonardite) 16%

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 20-30 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Πότιστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Μη χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting green». Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανασφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.



Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

Notice: Warranty of this material, either expressed or implied, is limited to a guarantee of the composition as shown on the label in as much as uses are beyond the seller's control. For the same reason, Seller is not liable for any injury to living things, crops, soils or materials which may result from the use or storage of this material. Do not store outside.

The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; PolySports and NS-54 are trademarks of The Andersons, Inc.

20 kg/net

APPA103HU4.1