

Nutri DG®

Greens - SGN 75

12 + 3 + 12 + Fe, Mn

(12 + 1.3 + 10.0 + Fe, Mn)

Bio-enhanced with Amvital™

USA/INT	12 + 3 + 12 + Fe, Mn
12.0%	Total Nitrogen (N) 12.0% Ammoniacal Nitrogen (N)
3.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from monoammonium phosphate
12.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
17.0%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate
0.5%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Mn 12 + 0 + 12 + Mn
12.0%	Total Nitrogen (N) 12.0% Ammoniacal Nitrogen
12.0%	Potassium Oxide (K ₂ O) water soluble
42.5%	Sulphur Trioxide (SO ₃) water soluble
0.5%	Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Mn 12 + 0 + 10 + Mn
12%	Total Nitrogen (N) 12.0% Ammoniacal Nitrogen
10.0%	Potassium (K) water soluble
17.0%	Sulphur (S) water soluble
0.5%	Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	EC-DÜNGER NK-DÜNGER, MANGANHALTIG 12 + 0 + 12 + Mn
12,0 %	Gesamtstickstoff (N) 12,0 % Ammoniumstickstoff
12,0 %	Kaliumoxid (K ₂ O) wasserlöslich
42,5 %	Schwefeltrioxid (SO ₃) wasserlöslich
0,5 %	Mangan (Mn) wasserlöslich

Nettogewicht: 20 kg

Import/kehrbringer: Turf Handels GmbH, Am Hariboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Das Produkt in einer Dosierung von 15-25 g/m² auf aktiv wachsendem Rasen verstreuen. Auf trockenes Blattwerk streuen. Sofort nach der Ausbringung mindestens 5 mm Wasser versprühen, damit sich die Partikel in der Wurzelzone verteilen und auflösen. Aufgrund von Schwankungen bzgl. Temperatur und pH-Gehalt des Wassers sollte die Bewässerung zweimal in einem Abstand von 10-15 Minuten stattfinden. Auf diese Weise können sich die Partikel in der Wurzelzone gründlicher verteilen. Die Partikelfarbe kann je nach Produktcharge anders ausfallen. Bei Temperaturen über 25°C nur in geringer Dosierung verstreuen und sofort nach der Behandlung bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das auf Beton und anderen Oberflächen Flecken hinterlassen kann. Zurückgebliebene Partikel sofort wegbürsten oder bläsen, um eine Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Herunterfallen des oberen Rands wieder fest verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Keine nicht verbrauchten Produktreste im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Italia	CONCIME CE Concime NK (S) 12-12 (42.5) contenente urea formaldeide a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione con Manganese (Mn)
12%	Azoto (N) totale
12%	Azoto (N) ammoniacale
12%	Ossido di potassio (K ₂ O), solubile in acqua
42.5%	Anidride solforica (SO ₃), solubile in acqua
0.5%	Manganese (Mn) solubile in acqua

Prodotta e confezionata da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera, 1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: applicare 15-25 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo di irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa applicatore o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Norge	NPK-gjødsel med Fe og Mn 12 – 1 – 10 (12–3–12)
12,0%	Nitrogen (N) 12,0% ammonium-N
1,3%	Fosfor (P), vannløselig 3,0% fosforpentoksyd (P ₂ O ₅)
10,0%	Kalium (K) 12,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
17,0%	Svovel (S)
0,3%	Jern (Fe)
0,5%	Mangan (Mn)

Basert på ammoniumfosfat, kaliumsulfat, kaliummagnesiumsulfat, samt jern- og mangansulfat. Inneholder Amvital.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling NORGE

Reg. nr. (Mattilsynet): 4413

Anbefalte gjødselmengder: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Gjødsla tilføres når grasen er i vekst. Umiddelbart etter påføring, påtære et minimum av 5 mm vann for å dispersere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vannet i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sving. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved leing eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsla skal lagres tørt.

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE Mn 12 + 0 + 10 + Mn
12%	Samlet kvælstof (N) 12% Ammoniumkvælstof
10%	Kalium (K) vandopløseligt
17%	Svovl (S) vandopløseligt
0,5%	Mangan (Mn) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikationsrater: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-25 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføring, påføres mindst 5 mm vand at dispersere partikler i rotzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rotzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25 °C og overvisi umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at fæje eller blæse for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et tørt, tørt sted. Forsejld den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας 31	12 + 3 + 12 + Fe, Mn
12,0%	Ολικό άζωτο (N) 12,0% Αμμωνιακό άζωτο (N)
3,0%	Διαθεσίμο φωσφορικό (P ₂ O ₅) από το όξινο φωσφορικό αμμώνιο
12,0%	Διαλυτή ποτάσα (K ₂ O) από θειικό κάλιο
17,0%	Ολικό θείο (S) από θειικό άλας
0,3%	Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός από θειικό σίδηρο
0,5%	Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό από θειικό μαγγάνιο

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m². Εφαρμόστε σε ζήνη φυλλωσιά. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερού για να διαλυθεί τα σωματίδια στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζεται την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λέκδες σε τοιμίνο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπιμα ή ψώμα για να αποφύγετε το λέκισμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να είναι σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες επιπλέοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντας το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET Mn 12 + 0 + 12 + Mn
12,0%	totaal stikstof (N) 12,0% ammoniakstikstof
12,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
42,5%	zwaaveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar
0,5%	mangaan (Mn), in water oplosbaar

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm inwateren om deeltjes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variaties in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenpoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltjes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltjes kan van partij tot partij variëren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gebruik de deeltjes onmiddellijk opgeven of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOLEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroomachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroomachines verwijderen.

Taiwan (R.O.C.)	12 + 3 + 12 + Fe, Mn
12.0%	Total Nitrogen (N) 12.0% Ammoniacal Nitrogen (N)
3.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from monoammonium phosphate
12.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
17.0%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate
0.5%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NK CON Mn 12 + 0 + 12 + Mn
12,0%	Nitrógeno total (N) 12,0% Nitrógeno amoniacal (N)
12,0%	Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
42,5%	Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua
0,5%	Manganeso (Mn) soluble en agua

Bajo en cloro. Se debe usar sólo se reconozca que es necesario. No exceda las dosis recomendadas.

Importada a España por:

Dosis de aplicación: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplique 15-25 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o soplado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.

Australia	12 + 1.3 + 10 + Fe, Mn
12.0%	Total Nitrogen (N) 12.00% Ammoniacal Nitrogen
1.3%	Phosphorous (P) from ammonium phosphate
10.0%	Potassium (K) from potassium sulfate
17.0%	Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.5%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 1.5 - 2.5 kg/100 m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5 - 2.5 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings		
		15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²
5 km/hr	3.4 m	1 3/4	K	L
5 km/hr	0.9 m	3 3/4	4 1/4	5

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.



Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

20 kg/net

APPG12MDG4.1

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; Amvital is a trademark of The Andersons, Inc.

Warning
CAUSES SKIN AND SERIOUS EYE IRRITATION

Precautionary Statements
Wear protective gloves and clothing. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Avoid breathing dusts. Use only outdoors or in well-ventilated area. Call poison control or seek medical attention if you feel unwell. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product.

First Aid if inhaled: Move victim to fresh air and keep comfortable, seek medical attention if unwell.

If on skin: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse.

If in eyes: Immediately flush with water for 15-20 minutes, seek medical attention if irritation persists.

If swallowed: Rinse mouth. DO NOT INDUCE VOMITING unless directed by a medical professional. Seek medical attention if unwell.