

Nutri DG®

Greens - SGN 75

13 + 0 + 26

(13 + 0 + 21.6)

100%

MUtech™

USA/INT	13 + 0 + 26
13%	Total Nitrogen (N) 2.0% Urea Nitrogen 6.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
26%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
8.8%	Total Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE 13 + 0 + 26
13.0%	Total nitrogen (N) 2.0% Ureic nitrogen (N) 11.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 6.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
26.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
22.0%	Sulphur trioxide (SO ₃) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE 13 + 0 + 21.6
13.0%	Total nitrogen (N) 2.0% Ureic nitrogen (N) 11.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 6.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
21.6%	Potassium (K) water soluble
8.8%	Sulphur (S) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	EG-DÜNGEMITTEL NK-Dünger mit Formaldehydharbstoff, 13 + 26
13 %	N Gesamtstickstoff davon: 2,0 % N Carbamidstickstoff 11,0 % N Formaldehydharbstoff 6,5 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharbstoff 4,5 % N heißwasserlöslicher Formaldehydharbstoff
26,0 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid

Nettogewicht: 20 kg

Hersteller:
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: während der Vegetationsperiode 15–30 g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Sofort nach der Ausbringung mindestens 5 mm Wasser versprühen, damit sich die Partikel in der Wurzelzone verteilen und auflösen. Aufgrund von Schwankungen bzgl. Temperatur und pH-Gehalt des Wassers sollte die Bewässerung zweimal in einem Abstand von 10-15 Minuten stattfinden. Auf diese Weise können sich die Partikel in der Wurzelzone gründlicher verteilen. Die Partikelfarbe kann je nach Produktcharge anders ausfallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Norge	EC GJØDNING NK GJØDNING INNEHOLDER UREA FORMALDEHYD 13 + 0 + 21,6
13,0%	Samlet Nitrogen (N) 2,0% Ureanitrogen (N) 11,0% Ureaformaldehyd 6,5% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i kaldt vann 2,4% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i varmt vann
21,6%	Kalium (K) vannoppløselig
8,8%	Svovel (S) vannoppløselig

Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570
Dilling, NORWAY

Påføringsrate: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Bruksanvisning: Påfør produktet på voksende torv med 15–30 g/m². Påfør på tørt løvverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultatet oppnådd ved å splitte vannning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Påfør kun med lave rater hvis temperaturen overskrider 25°C og vann øyeblikkelig etter påføring. Lagre produktet på et tørt, rent sted. Tett igjen den åpnede posen etter bruk ved å brette ned toppen og forvar den på et sikkert sted. Bruk bare rene, tørre spreder. Ikke la rester av produktet bli liggende i sprederen.

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREA FORMALDEHYD 13 + 0 + 21.6
13,0%	Samlet kvælstof (N) 2,0% Ammoniumkvælstof (N) 11,0% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med 6,5% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand 2,4% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand
21,6%	Kalium (K) vandopløseligt
8,8%	Svovl (S) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeret i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570
Dilling, NORWAY

Applikationsrater: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Bruksanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15–30 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rotzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rotzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25 °C og overrvis umiddelbart efter påføring. Opbevares et rent, tørt sted. Forsøgl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spreder. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spæder.

España/CE	ABONO CE ABONO COMPLEJO Abono NK contenido urea formaldehido 13 + 0 + 26
13,0%	Nitrógeno total (N) 2,0% de nitrógeno ureico (N) 11,0% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehido 6,5% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehido soluble en agua fría 2,4% Nitrógeno (N) de la urea formaldehido soluble únicamente en agua caliente
26,0%	de óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
22,0%	de azufre (SO ₃) soluble en agua

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15–30 grs/m² (150–300 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Dosis recomendada 15–30 gr/m². Aplicar cuando la hoja esté seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	13 + 0 + 26
13%	Ολικό άζωτο (N) 2,0% Άζωτο ουρίας 6,5% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου 4,5% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
26%	Διαλυτή ποτάσσα (K ₂ O) από θειικό κάλιο
8,8%	Ολικό θείο (S) από θειικό άλας

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωργικός Οίκος
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15–30 g/m². Εφαρμόστε σε ήπρη φυλλωσιά. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερού για να διαλύσετε τα σωματίδια στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζετε την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανασφραγίσετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Australia	13 + 0 + 21.6
13%	Total Nitrogen (N) 2.0% Urea Nitrogen 6.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
21.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
8.8%	Total Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 1.5–3.0 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	13 + 0 + 21.6
13%	Total Nitrogen (N) 2.0% Urea Nitrogen 6.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
21.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
8.8%	Total Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	CONCIME CE Concime NK (S) 13-26 (22) contenente urea formaldeide a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione
13%	Azoto (N) totale
2%	Azoto (N) ureico
11%	Azoto (N) dell'urea formaldeide
6,5%	Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda
2,4%	Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda
26%	Ossido di potassio (K ₂ O), solubile in acqua
22%	Anidride solforica (SO ₃), solubile in acqua

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Indicazioni per l'uso: applicare 15–30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET UREUM FORMALDEHYDE 13 + 0 + 26
13,0%	totaal stikstof (N) 2,0% ureumstikstof (N) 11,0% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 6,5% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 2,4% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water
26,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
22,0%	zwaveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkeilaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–30 g/m². Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm inwateren om deeltjes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variaties in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenvoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltjes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltjes kan van partij tot partij variëren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewaren. Op een sechste, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroomachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroomachines verwijderen.

Taiwan (R.O.C.)	菁好新世代新甲菁好(DG 13-0-26)
肥料登記證字號: 肥進(複)字第0128033號	
肥料品目: 複合肥料(6-01)	
國外廠牌商品名稱: 13-0-26 NUTRI DG 100% MUtech	
保證成份: 全氮13.0%、水溶性氧化鉀26.3%	
使用方法: 於作物生長季節春季至秋季適量施灑。成長中的草皮每平方公尺施用15~30公克，施用在乾的葉面。施肥後需澆水10~20分鐘。	
使用量: 15~30公克/平方公尺(每分地15~30 kg)	
包裝方式: 袋裝	淨重: 20 kg
有效期限: 4年	批號: 請詳見包裝
製造日期: 請詳見包裝	電話: 04-22135266
總代理: 菁修企業有限公司	
地址: 台中市東區自由路四段210號	
製造地: 美國	
製造廠商: THE ANDERSONS, INC.	
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

	Warning MAY CAUSE EYE IRRITATION MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION
Precautionary Statements Keep out of reach of children. Reado label before use. If medical advice is needed, have product container or label on hand. Call a poison center/physician if unwell. If on skin, wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations.	
First Aid If swallowed: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, but DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical attention.	
If on skin: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse.	
If in eyes: Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists.	
If inhaled: Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.	

	Spreaders		Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
					15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)			5 km/hr	3.0 m	1 1/2	J 1/2	K 1/2	L 1/4
SSD Drop Spreader - Settings for single pass application = FULL RATE			5 km/hr	0.9 m	3	3 3/4	4 1/4	5
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.								



Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.

20 kg/net

APPG131WDG4.2