Nutri DG®
Greens - SGN 75

14 + 7 + 14 + Fe, Mn
(14 + 3.1 + 11.6 + Fe, Mn)

60% MUtech™

USA/INT
14 + 7 + 14 + Fe, Mn

14.0% Total Nitrogen (N)
- 5.60% Ammoniacal Nitrogen
- 1.26% Urea Nitrogen
- 4.20% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.94% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

7.0% Available Phosphate (P_2O_5) from monoammonium phosphate

14.0% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

9.56% Total Sulfur (S) from sulfate

0.29% Iron (Fe) water soluble from iron sulfate

0.14% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC
EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn
14 + 7 + 14 + Mn

14.0% Total nitrogen (N)
- 5.6% Ammoniacal nitrogen (N)
- 1.3% Ureic nitrogen (N)
- 7.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 4.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 1.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

7.0% Phosphorous pentoxide (P_2O_5) soluble in neutral ammonium citrate and water with 6.6% water soluble P_2O_5

14.0% Potassium oxide (K_2O) water soluble

23.9% Sulphur trioxide (SO_3) water soluble

0.14% Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC
EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn
14 + 3.1 + 11.6 + Mn

14.0% Total nitrogen (N)
- 5.6% Ammoniacal nitrogen (N)
- 1.3% Ureic nitrogen (N)
- 7.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 4.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 1.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

3.1.0% Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 2.9% water soluble P

11.6% Potassium (K) water soluble

9.6% Sulphur (S) water soluble

0.14% Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC
ENGRAIS CE
ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'UREE FORMALDEHYDE AVEC DU Mn
14 + 7 + 14 + Mn

14.0% Azote (N) total
- 5.6% Azote (N) ammoniacal
- 1.3% Azote (N) uréique
- 7.1% Azote (N) de l'urée formaldehyde dont
  - 4.2% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau froide
  - 1.5% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau chaude

7.0% Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 6.6% P_2O_5 soluble dans l'eau

14.0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

23.9% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

0.14% Manganese (Mn) soluble dans l'eau

Pauvre en chlore. A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY
62560 VERCHOCQ - France

Taux d'application : 15 à 30 g/m² (150 à 300 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit à la dose de 15 à 30 grammes par m² pour obtenir une croissance optimale du gazon. Appliquer par temps sec et sur un feuillage sec. Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5 mm d'eau pour disperser les particules dans la zone de racines. En raison des variations de température et du pH de l'eau, les meilleurs résultats sont obtenus en divisant l'irrigation en 2 applications à 10-15 minutes d'écart. Ceci permettra une plus grande dispersion des particules dans la zone des racines. La couleur des particules peut varier d'un lot à un autre. En cas de chaleur supérieure à 25°C, minorer la dose et arroser immédiatement après application. Ce produit contient du fer qui peut tacher le béton et les autres surfaces durés ou poreuses. En cas d'application accidentelle sur ces surfaces, nettoyer en brossant ou soufflant afin d'éviter les taches. NE PAS NETTOYER AVEC DE L'EAU. Conserver le produit dans un endroit propre et sec. Refermer soigneusement le sac en repliant la partie supérieure et en l'attachant. Appliquer avec un épandeur propre et sec. Ne pas laisser de produit inutilisé dans les épandeurs.

Deutschland/Österreich
EC-DÜNGER
NPK-DÜNGER MIT HARNSTOFF-FORMALDEHYD Mit Mn
14 + 7 + 14 + Mn

14,0% Gesamtstickstoff (N)
- 5,6% Ammoniumstickstoff (N)
- 1,3% Harnstoffstickstoff (N)
- 7,1% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd mit
  - 4,2% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd, löslich nur in kaltem Wasser
  - 1,5% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd, löslich nur in heißem Wasser

7,0% Phosphorpentoxid (P_2O_5), löslich in neutralem Ammoniumcitrat und Wasser mit 6,6 % wasserlöslichem P_2O_5

14,0% Kaliumoxid (K_2O), wasserlöslich

23,9% Schwefeltrioxid (SO_3), wasserlöslich

0,14% Mangan (Mn), wasserlöslich

Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH
Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-30 g/m² auf einem aktiv wachsenden, trockenen Rasen ausstreuen. Sofort nach der Ausbringung mindestens 5 mm Wasser versprühen, damit sich die Partikel in der Wurzelzone verteilen und auflösen. Aufgrund von Schwankungen bzgl. Temperatur und pH-Gehalt des Wassers sollte die Bewässerung zweimal in einem Abstand von 10-15 Minuten stattfinden. Auf diese Weise können sich die Partikel in der Wurzelzone gründlicher verteilen. Die Partikelfarbe kann je nach Produktcharge anders ausfallen. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das auf Beton und anderen Oberflächen Flecken hinterlassen kann. Zurückgebliebene Partikel sofort wegbürsten oder -blasen, um eine Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Italia
FERTILIZZANTE EC
FERTILIZZANTE NPK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE CON Mn
14 + 7 + 14 + Mn

14,0% Totale azoto (N)
- 5,6% Azoto ammoniacato (N)
- 1,3% Azoto ureico (N)
- 7,1% Azoto (N) da urea formaldeide con
  - 4,2% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda
  - 1,5% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda

7,0% di pentossido di fosforo (P_2O_5) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 6,6% di P_2O_5 solubile in acqua

14,0% di ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua

23,9% di trioossido di zolfo (SO_3) solubile in acqua

0,14% di manganese (Mn) solubile in acqua

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Tassi di applicazione: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: applicare 15-30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa applicare o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Sverige
EU-GÖDSELMEDEL
NPK-gödselmedel som innehåller urea formaldehyd med Mn
14 + 3,1 + 11,6 + Mn

14,0% Total andel kväve (N)
- 5,6% Ammoniakkväve (N)
- 1,3% Kväve (N) som urea
- 7,1% Urea formaldehyd
  - 4,2% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i kallt vatten
  - 1,5% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i varm vatten

3,1% Fosfor (P) löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten med 2,9% P vattenlöslig

11,6% Kalium (K) vattenlöslig

9,6% Svavel (S) vattenlöslig

0,14% Mangan (Mn) vattenlöslig

Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570 Dilling NORGE

Dosering: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Gödsla när gräset är i tillväxt. Omedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispergera partiklar in i rotzonen. På grund av variationer i temperatur och vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersionen i rotzonen. Partikel färg kan variera från parti till parti. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25°C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. Denna produkt innehåller järn som kan missfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sopning eller blåsning. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras torrt.

Norge
EC GJØDNING
NPK GJØDNING INNEHOLDER UREAFORMALDEHYD MED Mn
14 + 3,1 + 11,6 + Mn

14,0% Samlet Nitrogen (N)
- 5,6% Ammoniakknitrogen (N)
- 1,3% Ureanitrogen (N)
- 7,1% Ureaformaldehyd
  - 4,2% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i kaldt vann
  - 1,5% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i varmt vann

3,1% Fosfor (P) oppløselig i nøytralt ammoniumcitrat og vann med 2,9% P oppløselig i vann

11,6% Kalium (K) oppløselig i vann

9,6% Svovel (S) oppløselig i vann

0,14% Mangan (Mn) oppløselig i vann

Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570
Dilling, NORWAY

Anbefalte gjødselmengder: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Gjødsla tilføres når graset er i vekst, og på tørt bladverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi I vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vanning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviing. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feiing eller blåsing. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

Denmark
EC KUNSTGØDNING
NPK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREAFORMALDEHYD MED Mn
14 + 3,1 + 11,6 + Mn

14,0% Samlet kvælstof (N)
- 5,6% Ammoniumkvælstof (N)
- 1,3% Ureakvælstof (N)
- 7,1% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med
  - 4,2% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand
  - 1,5% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand

3,1% Fosfor (P) opløseligt i neutral ammoniumcitrat og vand med 2,9% vandopløseligt P

11,6% Kalium (K) vandopløseligt

9,6% Svovl (S) vandopløseligt

0,14% Mangan (Mn) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikationsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-30 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rodzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rodzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25°C og overrisl umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.

België
EC-KUNSTMEST
NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE; BEVAT Mn
14 + 7 + 14 + Mn

14,0% totaal stikstof (N)
- 5,6% ammoniakstikstof (N)
- 1,3% ureumstikstof (N)
- 7,1% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan:
  - 4,2%stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water
  - 1,5%stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water

7,0% Fosforpentoxide (P_2O_5), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water, met 6,6% in water oplosbaar P_2O_5

14,0% kaliumoxide (K_2O), in water oplosbaar

23,9% zwaveltrioxide (SO_3), in water oplosbaar

0,14% mangaan (Mn), in water oplosbaar

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-30 g/m². Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm inwateren om deeltjes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variaties in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenpoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltjes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltjes kan van partij tot partij variëren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorste deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Belgique
ENGRAIS CE
ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'UREE FORMALDEHYDE AVEC DU Mn
14 + 7 + 14 + Mn

14,0% Azote (N) total
- 5,6% Azote (N) ammoniacal
- 1,3% Azote (N) uréique
- 7,1% Azote (N) de l'urée formaldehyde dont
  - 4,2% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau froide
  - 1,5% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau chaude

7,0% Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 6,6% P_2O_5 soluble dans l'eau

14,0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

23,0% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

0,14% Manganese (Mn) soluble dans l'eau

Pauvre en chlore. A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen
Belgique

Taux d'application : 15 à 30 g/m² (150 à 300 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit à la dose de 15 à 30 grammes par m² pour obtenir une croissance optimale du gazon. Appliquer par temps sec et sur un feuillage sec. Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5 mm d'eau pour disperser les particules dans la zone de racines. En raison des variations de température et du pH de l'eau, les meilleurs résultats sont obtenus en divisant l'irrigation en 2 applications à 10-15 minutes d'écart. Ceci permettra une plus grande dispersion des particules dans la zone des racines. La couleur des particules peut varier d'un lot à un autre. En cas de chaleur supérieure à 25°C, minorer la dose et arroser immédiatement après application. Ce produit contient du fer qui peut tacher le béton et les autres surfaces durés ou poreuses. En cas d'application accidentelle sur ces surfaces, nettoyer en brossant ou soufflant afin d'éviter les taches. NE PAS NETTOYER AVEC DE L'EAU. Conserver le produit dans un endroit propre et sec. Refermer soigneusement le sac en repliant la partie supérieure et en l'attachant. Appliquer avec un épandeur propre et sec. Ne pas laisser de produit inutilisé dans les épandeurs.

España/CE
ABONO CE
ABONO COMPLEJO
ABONO NPK contenido urea formaldehído con Mn
14 + 7 + 14 + Mn

14,0% Nitrógeno total (N)
- 5,6% Nitrógeno amoniacal (N)
- 1,3% de nitrógeno ureico (N)
- 7,1% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehído
  - 4,2% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehído soluble en agua fría
  - 1,5% Nitrógeno (N) de la urea formaldehído soluble únicamente en agua caliente

7,0% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua con 6,6% soluble en agua P_2O_5

14,0% de óxido de potasio (K_2O) soluble en agua

23,9% de azufre (SO_3) soluble en agua

0,14% Manganeso (Mn) soluble en agua

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15-30 grs/m² (150-300 Kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplique 15-30 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o soplado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31
14 + 7 + 14 + Fe, Mn

14,0% Ολικό άζωτο (N)
- 5,6% Αμμωνιακό άζωτο
- 1,26% Άζωτο ουρίας
- 4,20% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
- 2,94% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου

7,0% Διαθέσιμο φωσφορικό (P_2O_5) από το όξινο φωσφορικό αμμώνιο

14,0% Διαλυτή Ποτάσσα (K_2O) από το θειικό κάλιο και θειικό κάλιο μαγνησίας

9,56% Ολικό θείο (S) από θειικό άλας

0,3% Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός από θειικό σίδηρο

0,14% Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό από θειικό μαγγάνιο

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Geoponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-30 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερού για να διαλύσετε τα σωματίδια στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζετε την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφύγετε το λέκιασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλίζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)
14 + 7 + 14 + Fe, Mn

14.0% Total Nitrogen (N)
- 5.60% Ammoniacal Nitrogen
- 1.26% Urea Nitrogen
- 4.20% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.94% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

7.0% Available Phosphate (P_2O_5) from ammonium phosphate

14.0% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

9.56% Total Sulfur (S) from sulfate

0.29% Iron (Fe) water soluble from iron sulfate

0.14% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Warning
HARMFUL IF SWALLOWED
MAY CAUSE MILD SKIN IRRITATION
MAY CAUSE EYE IRRITATION
MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION

Precautionary Statements

Keep out of reach of children. Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label on hand. Call a poison center/physician if unwell. If on skin, wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations.

First Aid

If swallowed: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, but DO NOT induce vomiting. Seek immdiate medical attention.

If on skin: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse.

If in eyes: Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists.

If inhaled: Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.

Australia
14 + 3.1 + 11.6 + Fe, Mn

14.0% Total Nitrogen (N)
- 5.6% Ammoniacal Nitrogen
- 1.3% Urea Nitrogen
- 4.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

3.1% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

11.6% Potassium (K) from potassium sulfate

9.6% Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate

0.14% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 1.5 - 3.0 kg/100 m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5 - 3.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand
14 + 3.1 + 11.6 + Fe, Mn

14.0% Total Nitrogen (N)
- 5.6% Ammoniacal Nitrogen
- 1.3% Urea Nitrogen
- 4.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

3.1% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

11.6% Potassium (K) from potassium sulfate

9.6% Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate

0.14% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m²	20 g/m²	25 g/m²	30 g/m²
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	3.0 m	I 3/4	J 3/4	K 3/4	L 1/2
SSD Drop Spreader - Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	0.9 m	3 1/4	4	4 1/2	5 1/4

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.

The Andersons®

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

20 kg/net

APPG141WMDG4.1

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.;
MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.

C18