

# Tee Time®

## SGN 100

# 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu

## (14 + 12.2 + 8.3 + Fe, Mn, Zn, Cu)

# 50%

## MUtech™

USA/INT	14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.92% Ammoniacal Nitrogen 2.13% Urea Nitrogen 3.50% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.45% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
28.0%	Available Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) from ammonium phosphate
10.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
3.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15-25 g/m<sup>2</sup> (150-250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total nitrogen (N) 5.9% Ammoniacal nitrogen (N) 2.1% Ureic nitrogen (N) 6.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 3.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
28.0%	Phosphorus pentoxide (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble in neutral ammonium citrate and water with 26.3% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
10.0%	Potassium oxide (K <sub>2</sub> O) water soluble
8.5%	Sulphur Trioxide (SO <sub>3</sub> ) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
1.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd, Block 5 Unit 1 - Bandedth Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m<sup>2</sup> (150-250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 14 + 12.2 + 8.3 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total nitrogen (N) 5.9% Ammoniacal Nitrogen (N) 2.1% Ureic Nitrogen (N) 6.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 3.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
12.2%	Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 11.5% water soluble P
8.3%	Potassium (K) water soluble
3.4%	Sulphur (S) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
1.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd, Block 5 Unit 1 - Bandedth Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m<sup>2</sup> (150-250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	EG-DÜNGEMITTEL NPK(S)-Dünger mit Formaldehydnährstoff, Schwefel und Spurennährstoffen – Mischdünger -, 14-28-10 (-3,3) „Zur Düngung von Grünland“
14 %	N Gesamtsäurestickstoff davon: 5,9 % N Ammoniumstickstoff 2,1 % N Carbamidstickstoff 6,0 % N Formaldehydnährstoff davon: 3,5 % N kalhwasserlöslicher Formaldehydnährstoff 2,5 % N heilwasserlöslicher Formaldehydnährstoff
28 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> neutral-ammoniacalisches und wasserlösliches Phosphat davon 26,3% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> wasserlösliches Phosphat
10 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
3,4 %	S Schwefel
0,1 %	Cu Kupfer
1,0 %	Fe Eisen
0,1 %	Mn Mangan
0,1 %	Zn Zink

Nettogewicht: 20 kg

Hersteller:  
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15-25 g/m<sup>2</sup> (150-250 kg/ha)

**Anwendungsempfehlung:** Bei Neuinssaat, Nachsaaten oder P-Mangelstandorten mit 15-25 g/m<sup>2</sup> auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasenbete fallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren. Trocken und sauber lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schritt ohne Fangleiche durchführen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NPK FORMALDEHIDO DE UREA CON Fe, Mn, Zn, Cu 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Nitrógeno total (N) 5.9% Nitrogeno amoniacal (N) 2.1% Nitrogeno ureico (N) 6.0% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, con 3.5% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua fría 1.3% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua caliente
28.0%	Pentóxido de fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble en citrato de amonio neutro y agua, con 26.3% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> soluble en agua
10.0%	Oxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua
8.5%	Tríóxido de azufre (SO <sub>3</sub> ) soluble en agua
0.1%	Cobre (Cu)
1.0%	Hierro (Fe)
0.1%	Manganeso (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Bajo en cloro. Se debe usar sólo se reconozca que es necesario. No exceda las dosis recomendadas.

Importada a España por:

Dosis de aplicación: 15-25 g/m<sup>2</sup> (150-250 kg/ha)

**Instrucciones de uso:** Aplique 15-25 g/m<sup>2</sup> del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Si la temperatura supera los 25 °C o si es inevitable aplicar sobre céspedes húmedos o mojados, riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o soplado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.

Italia	CONCIME CE concime NPK (S) 14-28-10 (8.5) contenente urea formaldeide con Cu, Fe, Mn e Zn - STARTER 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14,0%	Totale azoto (N) 5,9% Azoto ammoniacato (N) 2,1% Azoto ureico (N) 6,0% Azoto (N) da urea formaldeide con 3,5% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda 1,3% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda
28,0%	di pentossido di fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 26,3% di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua
10,0%	di ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua
8,5%	di triossido di zolfo (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua
0,1%	di rame (Cu)
1,0%	di ferro (Fe)
0,1%	di manganese (Mn)
0,1%	di zinco (Zn)

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Prodotto e confezionato da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l., via Luisevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15-25 g/m<sup>2</sup> (150-250 kg/ha)

**Istruzioni per l'uso:** applicare 15-25 g/m<sup>2</sup> di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Azote totale (N) 5,9% Azote ammoniacal (N) 2,1% Azote uréique (N) 6,0% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec 3,5% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide 1,3% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude
28.0%	Anhydride phosphorique (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 26,3% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> soluble dans l'eau
10.0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
8.5%	Anhydride sulfurique (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau
0.1%	Cuivre (Cu)
1.0%	Fer (Fe)
0.1%	Manganèse (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S., 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

Taux d'application : 15-25 g/m<sup>2</sup> (150-250 kg/ha)

**Mode d'emploi:** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25 °C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Norge	NPK-gjødsel med 50 % langsomt virkende N 14 – 12 – 8 (14 – 28 – 10)
14,0%	Nitrogen (N) 5,9% ammonium-N 2,1% urea-N 6,0% metylenurea Ivorav 2,5% vannløslig N (WIN)
12,2%	Fosfor (P) 28,0% fosforpentoksyd (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
8,3%	Kalium (K) 10,0% kaliumoksyd (K <sub>2</sub> O)
3,4%	Svovel (S)
1,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Sink (Zn)

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og sink sulfat, samt jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagerealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS, Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORGE  
Reg. nr. (Mattilsynet): 6187

Anbefalte gjødselmengder: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

Gjødsla tilføres når grasnet er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandene. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. Dette produktet inneholder jern som kan mislange betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feing eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsla skal lagres tørt.

Denmark	NPK-gødning med 50% langsomt virkende N 14 – 12 – 8 (14 – 28 – 10)
14,0%	Kvælstof (N) 5,9% ammonium-N 2,1% urea-N 6,0% metylenureinstof Ivorav 2,5% vandoploselig N (WIN)
12,2%	Phosphor (P) 28,0% Phosphorpentoxid (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
8,3%	Kalium (K) 10,0% kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)
3,4%	Svovl (S)
1,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Zink (Zn)

Basert på ammoniumphosphat, urninstof, metylenurininstof, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat, og jern-, kobber- mangan- og zinkoxid.

Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fotboldbaner, park og haveområder. De anbefalede mængder må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS, Gullfunnet 50, 1570 DILLING, NORGE

Anbefalede gødningsmængder: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

Gødning tilsættes, når græsset vokser. Det vandtes 4-5 minutter, efter at befrugtningen er gennemført for at bringe gødningsgraden ned i plante populationen. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (> 25 ° C), og vand straks for at undgå sveld. Dette produkt indeholder jern, der kan misfarve bet on og andre overflader. Fjern partikler straks ved at fejle eller blæse. VASK IKKE MED VAND. Til gødningsbrug kun tørt og re n gødningspredere. Lad ikke gødning forblive i spredere n. Gødning skal opbevares tørt.

België	EC-KUNSTMEST NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE 14 + 28 + 10
14,0%	toitaal stikstof (N) 5,9% ammoniumstikstof (N) 2,1% ureumstikstof (N) 6,0% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 3,5% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 1,3% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar in heet water
28,0%	Fosforpentoxide (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water, met 26,3% in water oplosbaar P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
10,0%	kaliumoxide (K <sub>2</sub> O), in water oplosbaar
8,5%	zwaaveltrioxide (SO <sub>3</sub> ), in water oplosbaar
0,1%	koper (Cu)
1,0%	ijzer (Fe)
0,1%	mangaan (Mn)
0,1%	zink (Zn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba, Lorkeñaan 14, 2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Gebruiksaanwijzing:** product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–25 g/m<sup>2</sup>. Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op bet on en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gevorste deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om viekten te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevleisen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Sverige	EU GÖDSELMEDEL NPK-gödselmedel med 50 % långtidsverkande N 14 – 12 – 10 (14 – 28 – 10)
14,0 %	Kväve (N) 5,9% ammonium-N 2,1% urea-N 6,0% metylenurea Ivorav 2,5% vattenlöslig N (WIN)
12,2%	Fosfor (P) 28,0% fosforpentoxid (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
8,3 %	Kalium (K) 10,0% kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)
3,4 %	Svavel (S)
1,0 %	Järn (Fe)
0,1 %	Koppar (Cu)
0,1 %	Mangan (Mn)
0,1 %	Zink (Zn)

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat, samt jern-, kobber-, mangan- og zinkoxid.

Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB, c/o Floratine Norge AS, Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORGE

Rekommenderad mängd: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25 ° C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. Denna produkt innehåller järn som kan misfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sopning eller blåsning. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselsprederare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridare n. Gödslet skal lagras tørt.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14,0%	Ολικό άζωτο (N) 5,9% Αμμωνιακό άζωτο 2,1% Άζωτο ουρίας 3,5% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου 2,5% Αδιόλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
28,0%	Διασθέσιμο φωσφορικό (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) από φωσφορικό αμιμόνιο
10,0%	Διαλυτή ποτάσσα (K <sub>2</sub> O) από θεικό κάλιο
3,4%	Ολικό θείο (S) από θειικό
0,1%	Ολικός Χαλκός (Cu) από οξείδιο του χαλκού
1,0%	Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου
0,1%	Μαγγάνιο (Mn) από οξείδιο μαγνανίου
0,1%	Ψευδάργυρος (Zn) από οξείδιο ψευδαργύρου

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωρονικός Οίκος, 3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)


**Οδηγίες χρήσης:** Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m<sup>2</sup>. Εφαρμόστε σε ήπρη φυλλωσιά. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβεί τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσιμα για να αποφεύγετε το λέκτισμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντες το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.


Taiwan (R.O.C.)	菁好牌花籃 (14-28-10)
肥料登記證字號：肥進（複）字第 0128013 號 肥料品目：複合肥料(6-01) 國外廠牌商品名稱：TEE TIME FERTILIZER 14-28-10 WITH 50% MUtech 保證成份：全氮 14.0%、內含銨態氮 5.9%、檸檬酸銨溶液性磷酐 28.0%、水溶性氧化鉀 10.0% 成品性狀：固態，顆粒狀 使用方法：於作物生長季節適量施灑，尤其是以新播種作物補充磷元素為主，施用後澆水10-20分鐘。 使用量：每平方公尺使用20-30公克，每分地20-30 kg。 包裝方式：袋裝 淨重：20 kg 有效期限：5年 批號：請詳見包裝 製造日期：請詳見包裝 電話：04-22135266 總代理：青修企業有限公司 地址：台中市東區自由路四段210號 製造地：美國 製造廠商：THE ANDERSONS, INC. P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

New Zealand	14 + 12.2 + 8.3 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.9% Ammoniacal Nitrogen 2.1% Urea Nitrogen 3.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
12.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
8.3%	Potassium (K) from potassium sulfate
3.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings		
			15 g/m <sup>2</sup>	20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>
<b>Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)</b> Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.0 m	J	K	L 1/4
<b>SSD Drop Spreader</b> Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	0.9 m	3 1/2	4 1/4	4 3/4
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					



**20 kg/net**  
**APPG142M4**

Manufactured by: The Andersons, Inc. P.O. Box 119, Maumee, OH 43537, U.S.A. www.andersonsplantrnutrient.com