

Tee Time®

SGN 100

14 + 0 + 9

(14 + 0 + 7.5)

<p>USA/INT</p> <p style="text-align: center;">14 + 0 + 9</p> <p>14.0% Total Nitrogen (N) 14.0% Ammoniacal Nitrogen</p> <p>9.0% Soluble Potash (K₂O) from potassium sulfate</p> <p>19.0% Total Sulfur (S) from sulfate</p> <p>Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>UK/EC</p> <p style="text-align: center;">EC FERTILISER NK FERTILISER 14 + 0 + 9</p> <p>14.0% Total nitrogen (N) 14.0% Ammoniacal nitrogen (N)</p> <p>9.0% Potassium oxide (K₂O) water soluble</p> <p>47.5% Sulphur trioxide (SO₃) water soluble</p> <p>Low in chloride. To be used only where there is a recognized need. Do not exceed the appropriate dose rates.</p> <p>Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP</p> <p>Application Rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>Eire/EC</p> <p style="text-align: center;">EC FERTILISER NK FERTILISER 14 + 0 + 7.5</p> <p>14.0% Total nitrogen (N) 14.0% Ammoniacal nitrogen (N)</p> <p>7.5% Potassium (K) water soluble</p> <p>19.0% Sulphur (S) water soluble</p> <p>Low in chloride. To be used only where there is a recognized need. Do not exceed the appropriate dose rates.</p> <p>Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP</p> <p>Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>France/EC</p> <p style="text-align: center;">ENGRAIS EC ENGRAIS NK 14 + 0 + 9</p> <p>14,0% Azote totale (N) 14,0% Azote ammoniacal (N)</p> <p>9,0% Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau</p> <p>47,5% Trioxyde de soufre (SO₃)</p> <p>Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.</p> <p>Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France</p> <p>Taux d'application : 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)</p> <p>Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–30 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.</p>
---	---	--	--

Deutschland/Österreich	
EG-DÜNGEMITTEL NK(-S)-Dünger mit Schwefel, 14-9 (-19)	
14 %	N Gesamtstickstoff davon: 14,0 % N Ammoniumstickstoff
9,0 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
19,0 %	S Schwefel
Nettogewicht: 20 kg	
Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn	

Aufwandmenge: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Anwendungsempfehlung: Während der Vegetationszeit bei Temperaturen bis 25°C mit 15–30 g/m ² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schnitt ohne Fangkörbe durchführen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!	

Norge	
NK-gjødsel 14 – 0 – 7 (14 - 0 - 9)	
14,0%	Nitrogen (N) 14,0% ammonium-N
7,5%	Kalium (K) 9,0% kaliumoksid (K ₂ O)
19,0%	Svovel (S)
Basert på ammonium- og kaliumsulfat.	
Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.	
Distributør i Norge:	Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling, NORGE
Anbefalte gjødselmengder: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Gjødsla tilføres når grasen er i vekst. Det vannes 5-6 mm etter at gjødsling er utført, for å løse opp gjødselkornene. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå svikader. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.	

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	
14 + 0 + 9	
14,0%	Ολικό άζωτο (N) 14,0% Αμμωνιακό άζωτο
9,0%	Διαλυτή ποτάσα (K ₂ O) από θειικό κάλιο
19,0%	Ολικό θείο (S) από θειικό
Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georonikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE	
Ρυθμοί εφαρμογής 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15–30 g/m ² . Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.	

Australia	
14 + 0 + 7.5	
14.0%	Total Nitrogen (N) 14.0% Ammoniacal Nitrogen
7.5%	Potassium (K) from potassium sulfate
19.0%	Sulfur (S) from sulfate
Application rates: 1.5–3.0 kg/100 m² (150–300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

España/CE	
ABONO CE NK Abono 14 + 0 + 9	
14,0%	Nitrógeno total (N) 14,0% Nitrógeno amoniacal (N)
9,0%	de óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
47,5%	de azufre (SO ₃) soluble en agua
Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando hay una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.	
Importador para España:	

Dosis de aplicación: 15–30 g/m² (150–300 Kg/ha)	
Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegurarse de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.	

Denmark	
NK-kunstgødning 14 – 0 – 7 (14 – 0 – 9)	
14,0%	Kvælstof (N) 14,0% ammonium-N
7,5%	Kalium (K) 9,0% kaliumoxid (K ₂ O)
19,0%	Svovl (S)
Baseret på ammonium- og kaliumsulfat.	
Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, parker og haver. De anbefalede mængder må ikke overskrides.	
Distributør i Danmark:	Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING, NORGE
Applikationsrater: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-25 g/m ² . Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvandig. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegel den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.	

Taiwan (R.O.C.)	
14 + 0 + 9	
14.0%	Total Nitrogen (N) 14.0% Ammoniacal Nitrogen
9.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
19.0%	Total Sulfur (S) from sulfate
Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

New Zealand	
14 + 0 + 7.5	
14.0%	Total Nitrogen (N) 14.0% Ammoniacal Nitrogen
7.5%	Potassium (K) from potassium sulfate
19.0%	Sulfur (S) from sulfate
Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Italia	
CONCIME CE Concime NK (S) 14-9 (47,5) contenente Azoto ammoniacale a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione	
Azoto (N) totale di cui Azoto (N) ammoniacale	14 % 14 %
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	9 %
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	47,5 %
Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)	
Distribuito da: EMERALD s.r.l.	



Dose: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Istruzioni per l'uso: Applicare 15-30 gr/mq di prodotto su manto erboso asciutto in crescita. Irrigare dopo l'applicazione con 5-6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25 °C applicare a dosaggi bassi e irrigare immediatamente. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed asciugando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti e asciutti. Non lasciare prodotto inusato negli spargitori.	


België	
EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST 14 + 0 + 9	
14,0%	totaal stikstof (N) 14,0% ammoniakstikstof (N)
9,0%	kaliumoxide (K ₂ O)
47,5%	zwaveltrioxide (SO ₃)
Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.	
Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – België	
Aan te brengen hoeveelheden: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m ² . Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.	

Sverige	
EU GÖDSELMEDEL NK-gödselmedel 14 – 0 – 7 (14 – 0 – 9)	
14,0 %	Kväve (N) 14,0% ammonium-N
7,5 %	Kalium (K) 9,0% kaliumoxid (K ₂ O)
19,0%	Svavel (S)
Baserat på ammonium- och kaliumsulfat.	
Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.	
Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling, NORGE	

Rekomenderad mängd: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25 °C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tørt.	

Belgique	
ENGRAIS EC ENGRAIS NK 14 + 0 + 9	
14,0%	Azote totale (N) 14,0% Azote ammoniacal (N)
9,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
47,5%	Trioxyde de soufre (SO ₃)
Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.	
Importé en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique	
Taux d'application : 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)	
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–30 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.	

 Spreaders 	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m²	20 g/m²	25 g/m²	30 g/m²
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.0 m	J	K	L 1/4	M 1/4
SS-2 Drop Spreader Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	0.9 m	4	4 1/2	5	5 1/2
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						



Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

20 kg/net

APPG144

The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.

A18