







# Tee Time®

## SGN 125

# 16 + 4 + 8

## (16 + 1.7 + 6.6)

<p><b>USA/INT</b> <b>16 + 4 + 8</b></p> <p>16.0% Total Nitrogen (N) 16.0% Ammoniacal Nitrogen</p> <p>4.0% Available Phosphate (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) from ammonium phosphate</p> <p>8.0% Soluble Potash (K<sub>2</sub>O) from potassium chloride</p> <p>16.5% Total Sulfur (S) from sulfate</p> <p><b>Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>UK/EC</b> <b>EC FERTILISER NK FERTILISER 16 + 0 + 8</b></p> <p>16.0% Total nitrogen (N) 16.0% Ammoniacal nitrogen (N)</p> <p>8.0% Potassium oxide (K<sub>2</sub>O) water soluble</p> <p>41.25% Sulphur trioxide (SO<sub>3</sub>) water soluble</p> <p>Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandearth Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP</p> <p><b>Application Rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>Eire/EC</b> <b>EC FERTILISER NK FERTILISER 16 + 0 + 6.6</b></p> <p>16.0% Total nitrogen (N) 16.0% Ammoniacal nitrogen (N)</p> <p>6.6% Potassium (K) water soluble</p> <p>16.5% Sulphur (S) water soluble</p> <p>Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandearth Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP</p> <p><b>Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>France/EC</b> <b>ENGRAIS EC ENGRAIS NK 16 + 0 + 8</b></p> <p>16,0% Azote totale (N) 16,0% Azote ammoniacal (N)</p> <p>8,0% Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau</p> <p>41,25% Anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau</p> <p>Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France</p> <p><b>Taux d'application : 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Mode d'emploi:</b> Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–30 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.</p>																																
<p><b>Deutschland/Österreich</b> <b>EG-DÜNGEMITTEL</b></p> <p><b>NK(-S)-Dünger mit Schwefel – Mischdünger - , 16-8 (16,5)</b></p> <p>16,0 % N Gesamtstickstoff 16,0 % N Ammoniumstickstoff</p> <p>8,0 % K<sub>2</sub>O wasserlösliches Kaliumoxid</p> <p>16,5 % S Schwefel</p> <p>Nettogewicht: 20 kg</p> <p><u>Hersteller:</u> Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn</p> <p><b>Aufwandmenge: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Anwendungsempfehlung:</b> Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15–30 g/m<sup>2</sup> auf einem aktiv wachsenden, trockenem Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. An einem sauberen, trockenem Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!</p>	<p><b>España/CE</b> <b>ABONO CE NK ABONO 16 + 0 + 8</b></p> <p>16,0% Nitrógeno total (N) 16,0% Nitrógeno amoniacal (N)</p> <p>8,0% Óxido de potasio (K<sub>2</sub>O) soluble en agua</p> <p>41,25% de azufre (SO<sub>3</sub>) soluble en agua</p> <p>Importado en España por :</p> <p><b>Dosis de aplicación: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Instrucciones de uso:</b> Aplique 15–30 g/m<sup>2</sup> del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.</p>	<p><b>Italia</b> <b>CONCIME CE Concime NK(S) 16-0-8 (41,2)</b></p> <p>16,0% Totale azoto (N) 16,0% Azoto ammoniacale (N)</p> <p>8,0% di ossido di potassio (K<sub>2</sub>O), solubile in acqua</p> <p>41,25% di triossido di zolfo (SO<sub>3</sub>) solubile in acqua</p> <p>Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)</p> <p>Distribuito da: EMERALD s.r.l.</p> <p><b>Dose: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Indicazioni per l'uso:</b> Applicare 15–30 g/m<sup>2</sup> di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.</p>	<p><b>Sverige</b> <b>EU GÖDSELMEDEL NK-gödselmedel 16-0-7 (16-4-8)</b></p> <p>16,0% Kväve (N) 16,0% ammonium-N</p> <p>6,6% Kalium (K) 8,0% kaliumoxid (K<sub>2</sub>O)</p> <p>16,5% Svavel (S)</p> <p>Baserat på ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, liksom kaliumklorid.</p> <p>Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.</p> <p>Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling NORGE</p> <p><b>Rekomenderad mängd: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p>Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (&gt; 25°C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tørt.</p>																																
<p><b>Norge</b> <b>NK-gjødsel 16 – 2 – 7 (16-4-8)</b></p> <p>16,0% Nitrogen (N) 16,0% ammonium-N</p> <p>1,7% Fosfor (P) 4,0% fosforpentoksyd (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</p> <p>6,6% Kalium (K) 8,0% kaliumoksyd (K<sub>2</sub>O)</p> <p>16,5% Svovel (S)</p> <p>6,7% Klor (Cl)</p> <p>Basert på ammoniumfosfat, kaliumsulfat samt kaliumklorid.</p> <p>Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.</p> <p>Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling NORGE</p> <p><b>Anbefalte gjødselmengder: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p>Gjødsla tilføres når graset er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestanden. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (&gt; 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.</p>	<p><b>Denmark</b> <b>NK-gødning 16 – 2 – 7 (16-4-8)</b></p> <p>16,0% Kvælstof (N) 16,0% ammonium-N</p> <p>1,7% Phosphor (P) 4,0% Phosphorpentoxid (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</p> <p>6,6% Kalium (K) 8,0% kaliumoxid (K<sub>2</sub>O)</p> <p>16,5% Svovl (S)</p> <p>6,7% Chlor (Cl)</p> <p>Distributør i Danmark: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING</p> <p><b>Anbefalede godningsmængder: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p>Gødning tilsættes, når græsset vokser. Det vandes 4-5 minutter, efter at befrugtningen er gennemført for at bringe godningsgraden ind i planteopulationen. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (&gt; 25 °C), og vand straks for at undgå sved. Til godningsbrug kun tør og ren godningsspredere. Lad ikke gødning forblive i sprederen. Gødning skal opbevares tørt.</p>	<p><b>België</b> <b>EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST 16 + 0 + 8</b></p> <p>16,0% totaal stikstof (N) 16,0% ammoniakstikstof (N)</p> <p>8,0% kaliumoxide (K<sub>2</sub>O), in water oplosbaar</p> <p>41,25% zwaveltrioxide (SO<sub>3</sub>), in water oplosbaar</p> <p>Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – België</p> <p><b>Aan te brengen hoeveelheden: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Gebruiksaanwijzing:</b> product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–30 g/m<sup>2</sup>. Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen &gt; 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.</p>	<p><b>Belgique</b> <b>ENGRAIS EC ENGRAIS NK 16 + 0 + 8</b></p> <p>16,0% Azote totale (N) 16,0% Azote ammoniacal (N)</p> <p>8,0% Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau</p> <p>41,25% Anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau</p> <p>Importation en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique</p> <p><b>Taux d'application : 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Mode d'emploi:</b> Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–30 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.</p>																																
<p><b>Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31</b> <b>16 + 4 + 8</b></p> <p>16,0% Ολικό Άζωτο (N) 16,00% Αμμωνιακό άζωτο</p> <p>4,0% Διαθέσιμα Φωσφορικά (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</p> <p>8,0% Διαλυτό Κάλιο (K<sub>2</sub>O)</p> <p>16,5% Ολικό Θείο (S) 16,5% Συνδυασμένο Θείο (S)</p> <p>Na χρησιμοποιείτε μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβείτε τον κατάλληλο ρυθμό δόσης.</p> <p><b>Εισαγωγή στην Ελλάδα από:</b> Georponikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE</p> <p><b>Ρυθμοί εφαρμογής: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Οδηγίες χρήσης:</b> Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15–30 g/m<sup>2</sup>. Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζα να σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντας το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.</p>	<p><b>Taiwan (R.O.C.)</b> <b>16 + 4 + 8</b></p> <p>16.0% Total Nitrogen (N) 16.0% Ammoniacal Nitrogen</p> <p>4.0% Available Phosphate (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) from ammonium phosphate</p> <p>8.0% Soluble Potash (K<sub>2</sub>O) from potassium chloride</p> <p>16.5% Total Sulfur (S) from sulfate</p> <p><b>Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>																																		
<p><b>Australia</b> <b>16 + 1.7 + 6.6</b></p> <p>16.0% Total Nitrogen (N) 16.0% Ammoniacal Nitrogen</p> <p>1.7% Phosphate (P) from ammonium phosphate</p> <p>6.6% Potassium (K) from potassium chloride</p> <p>16.5% Total Sulfur (S) from sulfate</p> <p><b>Application rates: 1.5–3.0 kg/100 m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 kg/100 m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>New Zealand</b> <b>16 + 1.7 + 6.6</b></p> <p>16.0% Total Nitrogen (N) 16.0% Ammoniacal Nitrogen</p> <p>1.7% Phosphate (P) from ammonium phosphate</p> <p>6.6% Potassium (K) from potassium chloride</p> <p>16.5% Total Sulfur (S) from sulfate</p> <p><b>Application rates: 1.5–3.0 kg/100 m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 kg/100 m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">  <b>Spreaders</b>  </th> <th rowspan="2">Ground Speed</th> <th rowspan="2">Width of Coverage</th> <th colspan="4">Spreader Settings</th> </tr> <tr> <th>15 g/m<sup>2</sup></th> <th>20 g/m<sup>2</sup></th> <th>25 g/m<sup>2</sup></th> <th>30 g/m<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Model 2000 (cone 4) &amp; 2000 SR (cone 4)</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b></td> <td>5 km/hr</td> <td>3.7 m</td> <td>J 1/4</td> <td>K 1/4</td> <td>L 1/4</td> <td>M 1/4</td> </tr> <tr> <td><b>SSD Drop Spreader</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b></td> <td>5 km/hr</td> <td>0.9 m</td> <td>4</td> <td>4 3/4</td> <td>5 1/2</td> <td>6 1/4</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.</td> </tr> </tbody> </table>	 <b>Spreaders</b> 	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings				15 g/m <sup>2</sup>	20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>	<b>Model 2000 (cone 4) &amp; 2000 SR (cone 4)</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	5 km/hr	3.7 m	J 1/4	K 1/4	L 1/4	M 1/4	<b>SSD Drop Spreader</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	5 km/hr	0.9 m	4	4 3/4	5 1/2	6 1/4	Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.							<p>Manufactured by: The Andersons, Inc. P.O. Box 119 Maumee, OH 43537 U.S.A. www.andersonsplantnutrient.com</p> <h1>20 kg/net</h1> <h1>APPG164</h1> <p>The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.</p> <p>B18</p>
 <b>Spreaders</b> 	Ground Speed	Width of Coverage				Spreader Settings																													
			15 g/m <sup>2</sup>	20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>																													
<b>Model 2000 (cone 4) &amp; 2000 SR (cone 4)</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	5 km/hr	3.7 m	J 1/4	K 1/4	L 1/4	M 1/4																													
<b>SSD Drop Spreader</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	5 km/hr	0.9 m	4	4 3/4	5 1/2	6 1/4																													
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.																																			