

Tee Time[®]

SGN 100

18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu

(18 + 2.6 + 12.5 +Fe, Mn, Zn, Cu)

65%

MUtech™

USA/INT	18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18.0%	Total Nitrogen (N) 1.27% Ammoniacal Nitrogen 6.79% Urea Nitrogen 5.85% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.09% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
6.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
15.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
5.1%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	
EG-DÜNGEMITTEL	
NPK(-S)-Dünger mit Formaldehydharstoff, Schwefel und Spurennährstoffen - Mischdünger -, 18-6-15 (+S) „Zur Düngung von Grünland“	
18 %	N Gesamtstickstoff davon: 1,3 % N Ammoniumstickstoff 6,8 % N Carbamidstickstoff 9,9 % N Formaldehydharstoff davon: 5,9 % N kalihwasserlöslicher Formaldehydharstoff 2,1 % N heilwasserlöslicher Formaldehydharstoff
6 %	P ₂ O ₅ neutral-ammoniumtrithätsliches und wasserlösliches Phosphat davon 5,6% P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat
15 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
5,1 %	S Schwefel
0,1 %	Cu Kupfer
2,0 %	Fe Eisen
0,1 %	Mn Mangan
0,1 %	Zn Zink

Nettogewicht: 20 kg
 Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15–30g/m² (150–300kg/ha)
Anwendungsempfehlung: von April bis September mit 15–30 g/m² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren. Trocken und sauber lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer verwenden, keine Restmengen im Streuwagen zu rücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schnitt ohne Fangkörbe machen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Norge	NPK-gjødsel med 65 % langsomtvirkende N
	18 – 2 – 12 [*] (18 – 6 – 15)
18,0%	Nitrogen (N) 1,3% ammonium-N 6,8% urea-N 9,9% metylenurea derav 4,0% vannløselig N (WIN)
2,6%	Fosfor (P) 6,0% fosforpentoksyd (P ₂ O ₅)
12,5%	Kalium (K) 15,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
5,1%	Svovel (S)
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Sink (Zn)

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og sink sulfat, samt jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd.
 Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagerealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.
 Distributør i Norge: Floratine Norge AS
 Gullfunnet 50
 1570 Dilling, NORGE
 Reg. nr. (Mattilsynet): 6187

Anbefalte gjødselmengder: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
 Gjødsla tilføres når grasset er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebeståndet. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann tydeligvis for å unngå sviskader. Dette produktet inneholder jern som kan mislange betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feiling eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18,0%	Ολικό άζωτο (N) 1,3% Αμμωνιακό άζωτο 6,8% Αζωτο ουρίας 5,9% Άλλο υδατοδιαλυτό Αζωτο από ουρίες μεθυλενίου 4,0% Αδιάλυτο στο νερό Αζωτο από ουρίες μεθυλενίου
6,0%	Διασθένιμο φωσφορικό (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο
15,0%	Διαλυτή πτόσσσα (K ₂ O) από θεϊκό κάλιο
5,1%	Ολικό θείο (S) από θεϊκό
0,1%	Ολικός Χαλκός (Cu) από οξειδιο του χαλκού
2,0%	Σιδηρος (Fe) από οξειδιο σιδήρου
0,1%	Μαγνήσιο (Mn) από οξειδιο μαγνησίου
0,1%	Ψευδάργυρος (Zn) από οξειδιο ψευδαργύρου

Eισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωργικός Οίκος
 3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15–30 g/m². Εφαρμόστε σε ζηρή φυλλωσία. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ζεπερνούν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σκαμπίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσιμα για να αποφεύγετε το λεκίσμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Australia	18 + 2.6 + 12.5 + Fe, Mn, Zn, Cu
18.0%	Total Nitrogen (N) 1.3% Ammoniacal Nitrogen 6.8% Urea Nitrogen 5.9% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
2.6%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
12.5%	Potassium (K) from potassium sulfate
5.1%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 1.5–3.0 kg/100 m² (150–300 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 kg/100m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18.0%	Total nitrogen (N) 1.3% Ammoniacal nitrogen (N) 6.8% Ureic nitrogen (N) 9.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 5.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
6.0%	Phosphorus pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in neutral ammonium citrate and water with 5.6% water soluble P ₂ O ₅
15.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
12.8%	Sulphur Trioxide (SO ₂) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.
 Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
 Block 5 Unit 1 - Bandedth Industrial Estate
 Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP
Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NPK FORMALDEHIDO DE UREA CON Fe, Mn, Zn, Cu 18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18.0%	Nitrógeno total (N) 1,3% Nitrogeno amoniacal (N) 6,8% Nitrogeno ureico (N) 9,9% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, con 5,9% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua fría 2,1% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua caliente
6.0%	Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato de amonio neutro y agua, con 5,6% P ₂ O ₅ soluble en agua
15.0%	Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
12.75%	Trióxido de azufre (SO ₂) soluble en agua
0.1%	Cobre (Cu)
2.0%	Hierro (Fe)
0.1%	Manganeso (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Bajo en cloro. Se debe usar sólo se reconozca que es necesario. No exceda las dosis recomendadas.
 Importada a España por:
 Dosis de aplicación: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplique 15–30 g/m² del producto a céspedes que están creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue una despues de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de riego. Si la temperatura supera los 25°C o si es inevitable aplicar sobre céspedes húmedos o mojados, riegue inmediatamente despues de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o sopado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Solo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.

Denmark	NPK-gødning med 65% langsomtvirkende N
	18 – 2 – 12 [*] (18 – 6 – 15)
18,0%	Kvælstof (N) 1,3% ammonium-N 6,8% urea-N 9,9% metylenureinstof deraf 4,0% vandoploselig N (WIN)
2,6%	Fosfor (P) 6,0% Fosforpentoxid (P ₂ O ₅)
12,5%	Kalium (K) 15,0% kaliumoxid (K ₂ O)
5,1%	Svovl (S)
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Zink (Zn)

Baseret på ammoniumfosfat, urinstof, metylenurinostof, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat, og jern-, kobber-, mangan- og zinkoxid.
 Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, park og haveområder. De anbefalede mængder må ikke overskrides.
 Distributør i Danmark: Floratine Norge AS
 Gullfunnet 50
 1570 DILLING, NORGE

Anbefalede gødningsemængder: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
 Gødning tilslættes, når græsset vokser. Det vandés 4-5 minutter, efter at befrugtningen er gennemført for at bringe gødningsgraden ind i plantepopulationen. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (> 25 °C), og vand straks for at undgå sved. Dette produkt indeholder jern, der kan mislarbe betonen og andre overflader. Fjern partikler straks ved at feje eller blæse. VASK IKKE MED VAND. Til gødningsbrug kun tørt og rent gødningspredere. Lad ikke gødning forblive i sprederen. Gødning skal opbevares tørt.

Taiwan (R.O.C.)	菁好牌全部綠 (18-6-15)
肥料登記證字號: 肥進 (複) 字第 0128010 號	
肥料品目: 複合肥料 (6-01)	
國外廠牌商品名稱: TEE TIME FERTILIZER 18-6-15 WITH 65% NUTRALENE	
保證成份: 全氮18.0%、內含銨態氮2.3%、水溶性磷酐6.0 %、水溶性氧化鉀15.0%	
成品性狀: 固態, 顆粒狀	
使用方法: 春季至秋季, 每4-5週於每千平方英尺施用2.75 – 4磅之肥料, 秋末追肥一次, 每千平方英尺施用5.5磅。	
使用量: 1) 草坪- 15-30g/m ² * 2) 農業- 每分地15-30 kg *。	

New Zealand	18 + 2.6 + 12.5 + Fe, Mn, Zn, Cu
18.0%	Total Nitrogen (N) 1.3% Ammoniacal Nitrogen 6.8% Urea Nitrogen 5.9% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
2.6%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
12.5%	Potassium (K) from potassium sulfate
5.1%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 18 + 2.6 + 12.5 + Fe, Mn, Zn, Cu
18.0%	Total nitrogen (N) 1.3% Ammoniacal nitrogen (N) 6.8% Ureic nitrogen (N) 9.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 5.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
2.6%	Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 2.5% water soluble P
12.5%	Potassium (K) water soluble
5.1%	Sulphur (S)
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.
 Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
 Block 5 Unit 1 - Bandedth Industrial Estate
 Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP
Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NPK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE CON Fe, Mn, Zn, Cu 18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18,0%	Totale azoto (N) 1,3% Azoto ammoniacato (N) 6,8% Azoto ureico (N) 9,9% Azoto (N) da urea formaldeide con 5,9% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda 2,1% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda
6,0%	di pentossido di fosforo (P ₂ O ₅) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 5,6% di P ₂ O ₅ solubile in acqua
15,0%	di ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua
12,75%	di triossido di zolfo (SO ₂) solubile in acqua
0,1%	di rame (Cu)
2,0%	di ferro (Fe)
0,1%	di manganese (Mn)
0,1%	di zinco (Zn)

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.
 Prodotto e confezionato da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)
 Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
 via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Distribuito da: EMERALD s.r.l.
Dose: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Istruzioni per l'uso: applicare 15–30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle inerte immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE 18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18.0%	totaal stikstof (N) 1,3% ammoniakstikstof (N) 6,8% ureumstikstof (N) 9,9% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 5,9% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 2,1% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water
6.0%	Fosforpentoxide (P ₂ O ₅), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water, met 5,6% in water oplosbaar P ₂ O ₅
15.0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
12.8%	zwaveltrioxide (SO ₂), in water oplosbaar
0.1%	koper (Cu)
2.0%	ijzer (Fe)
0.1%	mangaan (Mn)
0.1%	zink (Zn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.
 Importeur voor België: Sports Management bvba
 Lorkenlaan 14
 Gullfunnet 50
 2950 Kapellen - België
Aan te brengen hoeveelheden: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–30 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorste deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPROEKEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Goeieinde verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE 18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18,0%	Azote totale (N) 1,3% Azote amoniacal (N) 6,8% Azote uréique (N) 9,9% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec 5,9% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide 2,1% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude
6,0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 5,6% P ₂ O ₅ soluble dans l'eau
15,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
12,8%	Anhydride sulfurique (SO ₂) soluble dans l'eau
0,1%	Cuivre (Cu)
2,0%	Fer (Fe)
0,1%	Manganèse (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.
 Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
 25 Rue de la Chapelle
 GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France
Taux d'application : 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Mode d'emploi: Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–30 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouler le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAYER A LEAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Sverige	EU GÖDSLEMEDEL NPK-gödselmedel med 65 % långtidsverkande N 18 – 2 – 12 [*] (18 – 6 – 15)
18,0%	Kväve (N) 1,3% ammonium-N 6,8% urea-N 9,9% metylenurea varav 4,0% vattenlöslig N (WIN)
2,6%	Fosfor (P) 6,0% fosforpentoxid (P ₂ O ₅)
12,5%	Kalium (K) 15,0% kaliumoxid (K ₂ O)
5,1%	Svavel (S)
2,0%	Järn (Fe)
0,1%	Koppar (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Zink (Zn)

Baserat på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kalium-, järn-, koppar-, mangan- og zinksulfat, samt järn-, koppar-, mangan- og zinkoxid.
 Bår endast användas vid behov till golf- og fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.
 Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
 c/o Floratine Norge AS
 Gullfunnet 50
 1570 Dilling, NORGE
Rekommenderad mängd: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)
Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25 °C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. Denna produkt innehåller järn som kan missfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sopning eller blåsning. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselsprifare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tørt.

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'UREE FORMALDEHYDE 18 + 6 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
18,0%	Azote (N) total 1,3% Azote (N) amoniacal 6,8% Azote (N) uréique 9,9% Azote (N) de l'urée formaldehyde dont 5,9% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau froide 2,1% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau chaude