

Tee Time®

SGN 125

20+5+20+ Fe, Mn, Zn, Cu

(20 + 2.2 + 16.6 + Fe, Mn, Zn, Cu)

50% MUtech™

USA/INT	20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20.0%	Total Nitrogen (N) 2.0% Ammoniacal Nitrogen 9.5% Urea Nitrogen 5.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 3.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
5.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
20.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
6.8%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	„Zur Düngung von Grünland“
EG-DÜNGEMITTEL NPK-(S)-Dünger mit Formaldehydharstoff, Schwefel und Spurennährstoffen - Mischdünger - ,20+5-20 (-6,8)	
20 %	N Gesamstickstoff davon: 2,0 % N Ammoniumstickstoff 9,5 % N Carbamidstickstoff 8,5 % N Formaldehydharstoff davon: 5,0 % N kalihwasserlöslicher Formaldehydharstoff 3,5 % N heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
5 %	P ₂ O ₅ neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat davon 4,7% P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat
20 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
6,8 %	S Schwefel
0,1 %	Cu Kupfer
2,0 %	Fe Eisen
0,1 %	Mn Mangan
0,1 %	Zn Zink
Nettogewicht: 20 kg	
Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Harbuden 48, A-8101 Gratkorn	

Aufwandmenge: 15-25g/m² (150-250kg/ha)
Anwendungsempfehlung: Während der Hauptvegetationszeit mit 15-25 g/m² auf Tees oder anderen Rasenflächen ausbringen. Um die Verteilung in der Rasenfläche zu optimieren anschließend mit mindestens 5-6 mm beregnen. Bei Temperaturen über 25°C mit geringer Aufwandmenge arbeiten und anschließend sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflegten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren. Sauber und trocken lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Norge	NPK-gjødsel med 50 % langsomtvirkende N 20 – 2 – 17 (20 – 5 – 20)
20,0%	Nitrogen (N) 2,0% ammonium-N 9,5% urea-N 8,5% metylenureas forvar 3,5% vannløselig N (WIN)
2,2%	Fosfor (P) 5,0% fosforpentoksyd (P ₂ O ₅)
16,6%	Kalium (K) 20,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
6,8%	Svovel (S)
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Sink (Zn)

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og sink-sulfat, samt jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd.
Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagerealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.
Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE
Reg. nr. (Mattilsynet): 6187

Anbefalte gjødselmengder: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Gjødsla tilføres når grasset er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestanden. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviktskader. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved leing eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20,0%	Ολικό άζωτο (N) 2,0% Αμμωνιακό άζωτο 9,5% Άζωτο ουρίας 5,0% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου 3,5% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
5,0%	Διασθένιο φωσφορικό (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο
20,0%	Διαλυτή πώσσσα (K ₂ O) από θειικό κάλιο
6,8%	Ολικό θείο (S) από θειικό
0,1%	Ολικός Χαλκός (Cu) από οξείδιο του χαλκού
2,0%	Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου
0,1%	Μαγγάνιο (Mn) από οξείδιο μαγγανίου
0,1%	Ψευδάργυρος (Zn) από οξείδιο ψευδαργύρου
Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωργικός Οίκος 3 Makedonias St., Athens, GREECE	

Ρυθμοί εφαρμογής 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m². Εφαρμόστε σε ζηρή φυλλωσιά. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αρμό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ζεπτερύνουν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφεύγετε το λέκτισμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντες το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα αποτός μετά τη χρήση.

Australia	20 + 2.2 + 16.6 + Fe, Mn, Zn, Cu
20.0%	Total Nitrogen (N) 2.0% Ammoniacal Nitrogen 9.5% Urea Nitrogen 5.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 3.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
2.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
16.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
6.8%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 1.5-2.5 kg/100 m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20.0%	Total nitrogen (N) 2.0% Ammoniacal Nitrogen 9.5% Ureic Nitrogen (N) 8.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 5.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.8% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
5.0%	Phosphorus pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in neutral ammonium citrate and water with 4.7% water soluble P ₂ O ₅
20.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
17.0%	Sulphur Trioxide (SO ₃) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

España/CE	ABONO CE NPK abono que contiene urea formaldehído CON Fe, Mn, Zn, Cu 20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20,0%	Nitrógeno total (N) 2,0% Nitrógeno amoniacal (N) 9,5% Ureic nitrogen (N) 8,5% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehído 5,0% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehído soluble en agua fría 1,8% Nitrógeno (N) de la urea formaldehído soluble únicamente en agua caliente
5,0%	Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro y agua con 4,7% de P ₂ O ₅ soluble en agua
20,0%	Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
17,0%	de azufre (SO ₃) soluble en agua
0,1%	de cobre (Cu)
2,0%	Hierro (Fe)
0,1%	Manganeso (Mn)
0,1%	de zinc (Zn)

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas. Importador para España:

Dosis de aplicación: 15-25 grs./m² (150-250 Kg./ha)
Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegurérese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Denmark	NPK-gødning med 50 % langsomtvirkende N 20 – 2 – 17 (20 – 5 – 20)
20,0%	Kvælstof (N) 2,0% ammonium-N 9,5% urea-N 8,5% metylenurinostof forvar 3,5% vandopløseligt N (WIN)
2,2%	Fosfor (P) 5,0% Fosforpentoxid (P ₂ O ₅)
16,6%	Kalium (K) 20,0% kaliumoxid (K ₂ O)
6,8%	Svovl (S)
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Zink (Zn)

Baseret på ammoniumfosfat, urinstof, metylenurinostof, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat, og jern-, kobber- mangan- og zinkoxid.
Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, park og haveområder. De anbefalede mængder må ikke overskrides.
Distributør i Danmark: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING, NORGE

Anbefalede gødningsmængder: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Gødning tilsættes, når græsset vokser. Det vandes 4-5 minutter, efter at befrugtningen er gennemført for at bringe gødningsgraden ind i plantepopulationen. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (> 25 °C), og vand straks for at undgå vask. Dette produkt indeholder jern, der kan misfarge betonen og andre overflader. Fjern partikler straks ved at fejle eller blæse. VASK IKKE MED VAND. Til gødningsbrug kun tør og ren gødningspredere. Lad ikke gødning forblive i sprederen. Gødning skal opbevares tørt.

Taiwan (R.O.C.)	20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20.0%	Total Nitrogen (N) 2.0% Ammoniacal Nitrogen 9.5% Urea Nitrogen 5.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 3.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
5.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
20.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
6.8%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	20 + 2.2 + 16.6 + Fe, Mn, Zn, Cu
20.0%	Total Nitrogen (N) 2.0% Ammoniacal Nitrogen 9.5% Urea Nitrogen 5.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 3.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
2.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
16.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
6.8%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 20 + 2.2 + 16.6 + Fe, Mn, Zn, Cu
20.0%	Total nitrogen (N) 2.0% Ammoniacal Nitrogen (N) 9.5% Ureic nitrogen (N) 8.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 5.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.8% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
2.2%	Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 2.0% water soluble P
16.6%	Potassium (K) water soluble
6.8%	Sulphur (S)
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	CONCIME CE Concime NPK (S) 20-5-20 (17) contenente Urea formaldeide a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione
Azoto (N) totale	20 %
di cui Azoto (N) ammoniacale	2,0 %
di cui Azoto (N) ureico	9,5 %
di cui Azoto (N) dell'urea formaldeide	8,5 %
di cui Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda	5,0 %
di cui Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda	3,5 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) da fosfato di ammonio	5 %
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	20 %
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	17 %
Rame (Cu) da Ossido di Rame	0,1 %
Ferro (Fe) da Ossido di Ferro	2 %
Manganese (Mn) da Ossido di Manganese	0,1 %
Zinco (Zn) da Ossido di Zinco	0,1 %

Prodotta e confezionata da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)
Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera, 1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15-25 g/mq (150-250 kg/ha)
Indicazioni per l'uso: applicare 15-25 gr/mq di prodotto su manto erboso asciutto in crescita. Irrigare dopo l'applicazione con 5-6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25 °C applicare a dosaggi bassi e irrigare immediatamente. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed asciugando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti e asciutti. Non lasciare prodotto inusato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE; BEVAT Fe, Mn, Zn, Cu 20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20,0%	totaal stikstof (N) 2,0% ammoniakstikstof (N) 9,5% ureumstikstof (N) 8,5% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 5,0% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 1,8% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water
5,0%	fosforpentoxide (P ₂ O ₅), oplosbaar in neutraal ammoniumtraat en water, met 4,7% in water oplosbaar P ₂ O ₅
20,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
17,0%	zweveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar
0,1%	koper (Cu)
2,0%	ijzer (Fe)
0,1%	mangaan (Mn)
0,1%	zink (Zn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden. Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkeilaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)
Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorst deeltes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te beveiligen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

France/EC	ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'UREE-FORMALDÉHYDE AVEC Fe, Mn, Zn, Cu 20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20,0%	Azote totale (N) 2,0% Azote ammoniacal (N) 9,5% Azote uréique (N) 8,5% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec 5,0% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide 1,8% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude
5,0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans une solution de citrate d'ammonium neutre et d'eau avec 4,7 % de P ₂ O ₅ soluble dans l'eau
20,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
17,0%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau
0,1%	Cuivre (Cu)
2,0%	Fer (Fe)
0,1%	Manganèse (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)

		Spreader Settings			
Model 2000 (cone 7); 2000 SR (cone 7) Settings for single pass application = FULL RATE	Ground Speed	Width of Coverage	15 g/m ²	20 g/m ²	
			25 g/m ²		
SSD Drop Spreader Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.4 m	J 1/2	K 1/2	L 1/2
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.	5 km/hr	0.9 m	4	4 3/4	5 1/2



Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonspanutrient.com

The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.

France/EC	ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'UREE-FORMALDÉHYDE AVEC Fe, Mn, Zn, Cu 20 + 5 + 20 + Fe, Mn, Zn, Cu
20,0%	Azote totale (N) 2,0% Azote ammoniacal (N) 9,5% Azote uréique (N) 8,5% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec 5,0% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide 1,8% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude
5,0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans une solution de citrate d'ammonium neutre et d'eau avec 4,7 % de P ₂ O ₅ soluble dans l'eau
20,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
17,0%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau
0,1%	Cuivre (Cu)
2,0%	Fer (Fe)
0,1%	Manganèse (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en France