Tee Time®
SGN 100

22 + 0 + 22 + Fe, Mn, Zn, Cu
(22 + 0 + 18.3 + Fe, Mn, Zn, Cu)

65% MUtech™

USA/INT

22 + 0 + 22 + Fe, Mn, Zn, Cu

22.0% Total Nitrogen (N)
- 9.85% Urea Nitrogen
- 7.15% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 5.00% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

22.0% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

7.48% Total Sulfur (S) from sulfate

0.1% Copper (Cu) from copper oxide

1.0% Iron (Fe) from ferric oxide

0.1% Manganese (Mn) from manganous oxide

0.1% Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC

EC FERTILISER
NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu
22 + 0 + 22 + Fe, Mn, Zn, Cu

22.0% Total nitrogen (N)
- 9.9% Ureic nitrogen (N)
- 12.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 7.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 2.6% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

22.0% Potassium oxide (K_2O) water soluble

18.7% Sulphur Trioxide (SO_3) water soluble

1.0% Iron (Fe)

0.1% Manganese (Mn)

0.1% Copper (Cu)

0.1% Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC

EC FERTILISER
NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu
22 + 0 + 18.3 + Fe, Mn, Zn, Cu

22.0% Total nitrogen (N)
- 9.9% Ureic Nitrogen
- 12.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 7.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 2.6% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

18.3% Potassium (K) water soluble

7.5% Sulphur (S) water soluble

1.0% Iron (Fe)

0.1% Manganese (Mn)

0.1% Copper (Cu)

0.1% Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 30°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC

ENGRAIS EC
ENGRAIS NK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE
22 + 0 + 22 + Fe, Mn, Zn, Cu

22,0% Azote totale (N)
- 9,9% Azote uréique (N)
- 12,1% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec
  - 7,2% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide
  - 2,6% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude

22,0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

18,7% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

1,0% Fer (Fe)

0,1% Manganèse (Mn)

0,1% Cuivre (Cu)

0,1% Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

Taux d'application : 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Mode d'emploi: Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.

Deutschland/Österreich

NK(-S)-Dünger mit Formaldehydharnstoff, Schwefel und Spurennährstoffen – Mischdünger - , 22-22 (-7,5)

„Zur Düngung von Grünland."

22,0 % N Gesamtstickstoff davon:
- 9,9 % N-Carbamidstickstoff
- 12,1 % N Formaldehydharnstoff davon:
  - 7,2 % N-kaltwasserlöslicher Formaldehydharnstoff
  - 2,6 % N-heißwasserlöslicher Formaldehydharnstoff

22,0 % K_2O wasserlösliches Kaliumoxid

7,5 % S Schwefel
0,1 % Cu Kupfer
1,0 % Fe Eisen
0,1 % Mn Mangan
0,1 % Zn Zink

Nettogewicht: 20 kg

Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Während der Hauptvegetationszeit mit 15-25 g/m² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schnitt ohne Fangkörbe durchführen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

España/CE

ABONO CE
NK abono que contenga urea formaldehído CON Fe, Mn, Zn, Cu
22 + 0 + 22 + Fe, Mn, Zn, Cu

22,0% Nitrógeno total (N)
- 9,9% de nitrógeno ureico (N)
- 12,1% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehído
  - 7,2% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehído soluble en agua fría
  - 2,6% Nitrógeno (N) de la urea formaldehído soluble únicamente en agua caliente

22,0% de óxido de potasio (K_2O) soluble en agua

18,7% de azufre (SO_3) soluble en agua

0,1% de cobre (Cu)

1,0% Hierro (Fe)

0,1% Manganeso (Mn)

0,1% de zinc (Zn)

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15-25 grs./m² (150-250 Kg. / ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C . Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad , asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Italia

FERTILIZZANTE EC
FERTILIZZANTE NK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE
15 + 0 + 29 + Fe, Mn, Zn, Cu

22,0% Totale azoto (N)
- 9,9% Azoto ureico (N)
- 12,1% Azoto (N) da urea formaldeide con
  - 7,2% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda
  - 2,6% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda

22,0% di ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua

18,7% di triossido di zolfo (SO_3) solubile in acqua

1,0% di ferro (Fe)

0,1% di manganese (Mn)

0,1% di rame (Cu)

0,1% di zinco (Zn)

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Prodotta e confezionato da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: applicare 15-25 g/m² . di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Sverige

EU GÖDSELMEDEL
NK-gödselmedel med 65 % långtidsverkande N
22 – 0 – 18
(22 – 0 – 22)

22,0 % Kväve (N)
- 9,9% urea-N
- 12,1% metylenurea
  - varav 5,0% vattenlöslig N (WIN)

18,3 % Kalium (K)
22,0% kaliumoxid (K_2O)

7,5% Svavel (S)

1,0 % Järn (Fe)

0,1% Koppar (Cu)

0,1% Mangan (Mn)

0,1% Zink (Zn)

Baserat på metylenurea, urea, kaliumsulfat, järn-, mangan-, koppar-, och zinksulfat, järn-, mangan-, koppar- och zinkoxid.

Bör endast användas vid påvisat behov. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Rekomenderad mängd: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Gödslet är särskilt lämpad när K-behovet är stort, och långstidsverkande kväve önskas. Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna minimum 5 mm efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25°C). Denna produkt innehåller järn som kan missfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sopning eller blåsning. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tort.

Norge

NK-gjødsel med 65 % langsomtvirkende N
22 – 0 – 18
(22 – 0 – 22)

22,0% Nitrogen (N)
- 9,9 % urea-N
- 12,1 % metylenurea
  - hvorav 5,0% vannuløselig N (WIN)

22,0% Kalium (K)
22,0% kaliumoksyd (K_2O)

7,5% Svovel (S)

1,0% Jern (Fe)

0,1% Mangan (Mn)

0,1% Kobber (Cu)

0,1% Sink (Zn)

Basert på metylenurea, urea, kaliumsulfat, jern-, mangan-, kobber- og sinksulfat, jern-, mangan-, kobber- og sinkoksyd.

Skal bare benyttes ved påvist behov. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORGE

Reg. nr. (Mattilsynet): 6642

Anbefalte gjødselmengder: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)

Denne gjødsla er spesielt godt egnet når K-behovet er stort, og ønsket om langsomtvirkende nitrogen er til stede. Gjødsla tilføres når græset er i vekst, og på tørt bladverk. Den vannes inn med minimum 5 mm, slik at partiklene «vaskes ned» i grasbestandet. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C). Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved leiing eller blåsing. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

Denmark

NK-gødning med 65% langsomtvirkende N
22 – 0 – 18
(22 – 0 – 22)

22,0% Kvælstof (N)
- 9,9% urea-N
- 12,1% methylenurinstof
  - hvoraf 5,0% vandopløseligt N (WIN)

22,0% Kalium (K)
22,0% kaliumoxid (K_2O)

7,5% Svovl (S)

1,0% Jern (Fe)

0,1% Mangan (Mn)

0,1% Kobber (Cu)

0,1% Zink (Zn)

Baseret på methylenurinstof, urinstof, kalium-, jern-, mangan-, kobber- og zinksulfat, jern-, mangan-, kobber- og zinkoxid.

Må kun bruges til dokumenterede behov. De anbefalede mængder må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING, NORGE

Anbefalede gødningsmængder: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Denne gødning er særlig egnet, når K-behovet er stor, og ønsket om langsomt virkende nitrogen er til stede. Gødning tilsættes, når græsset vokser, og på tørt løv. Den er vandet med mindst 5 mm, så partiklerne "vaskes ned" i græsarealer. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (> 25 ° C). Dette produkt indeholder jern, der kan misfarve beton og andre overflader. Fjern partikler straks ved at feje eller blæse. VASK IKKE MED VAND. Til gødningsbrug kun tør og ren gødningsspredere. Lad ikke gødning forblive i sprederen. Gødning skal opbevares tørt.

België

EC-KUNSTMEST
NK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE
15 + 0 + 29 + Fe, Mn, Zn, Cu

22,0% totaal stikstof (N)
- 9,9% ureumstikstof (N)
- 12,1% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan:
  - 7,2% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water
  - 2,6% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water

22,0% kaliumoxide (K_2O), in water oplosbaar

18,7% zwaveltrioxide (SO_3), in water oplosbaar

1,0% ijzer (Fe)

0,1% mangaan (Mn)

0,1% koper (Cu)

0,1% zink (Zn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorste deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Belgique

ENGRAIS EC
ENGRAIS NK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE
22 + 0 + 22 + Fe, Mn, Zn, Cu

22,0% Azote totale (N)
- 9,9% Azote uréique (N)
- 12,1% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec
  - 7,2% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide
  - 2,6% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude

22,0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

18,7% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

1,0% Fer (Fe)

0,1% Manganèse (Mn)

0,1% Cuivre (Cu)

0,1% Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen – Belgique

Taux d'application : 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Mode d'emploi: Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31

22 + 0 + 22 + Fe, Mn, Zn, Cu

22,0% Ολικό άζωτο (N)
- 9,9% Άζωτο ουρίας
- 7,1% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
- 5,0% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου

22,0% Διαλυτή ποτάσσα (K_2O) από θειικό κάλιο

7,5% Ολικό θείο (S) από θειικό

0,1% Ολικός Χαλκός (Cu) από οξείδιο του χαλκού

1,0% Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου

0,1% Μαγγάνιο (Mn) από οξείδιο μαγγανίου

0,1% Ψευδάργυρος (Zn) από οξείδιο ψευδαργύρου

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Geoponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφύγετε το λέκιασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλίζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)

得綠菁 (22-0-22)

肥料登記證字號：肥進 (微) 字第 0128004 號
肥料品目：雜項次量微量要素肥料 (4-41)
國外廠牌商品名稱：TEE TIME 22-0-22 WITH 65% MUTECH
保證成份：全氮 22.0%、 水溶性氧化鉀 22.0 %、 全鋅0.10%、 全銅 0.10%
成品性狀：固態，顆粒狀
使用方法：於作物生長季節春至秋末適量施灑。
使 用 量：春至秋季施用20公克/平方公尺，秋末追肥施用25公克/平方公尺。
包裝方式：袋裝 淨重：20 kg
有效期限：5年 批號：請詳見包裝
製造日期：請詳見包裝 電話：04-22135266
總代理：菁修企業有限公司
地址：台中市東區自由路四段210號
製造地：美國
製造廠商： THE ANDERSONS, INC.
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537

Australia

22 + 0 + 18.3 + Fe, Mn, Zn, Cu

22.0% Total Nitrogen (N)
- 9.9% Urea Nitrogen
- 7.1% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 5.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

18.3% Potassium (K) from potassium sulfate

7.5% Total Sulfur (S) from sulfate

0.1% Copper (Cu) from cupric oxide

1.0% Iron (Fe) from ferric oxide

0.1% Manganese (Mn) from manganous oxide

0.1% Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 1.5–2.5 kg/100 m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100 m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand

22 + 0 + 18.3 + Fe, Mn, Zn, Cu

22.0% Total Nitrogen (N)
- 9.9% Urea Nitrogen
- 7.1% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 5.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

18.3% Potassium (K) from potassium sulfate

7.5% Total Sulfur (S) from sulfate

0.1% Copper (Cu) from cupric oxide

1.0% Iron (Fe) from ferric oxide

0.1% Manganese (Mn) from manganous oxide

0.1% Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m²	20 g/m²	25 g/m²	
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	3.0 m	I 3/4	J 3/4	L	
SSD Drop Spreader Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	0.9 m	3 1/2	4 1/4	5	

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.

The Andersons®

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

20 kg/net
APPG225M4

L17

The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.