

PolySports™








SGN 150

23 + 2 + 10 + Fe

(23 + 0.9 + 8.3 + Fe)

65%

NS-54™

<p>USA/INT</p> <p>23 + 2 + 10 + Fe</p> <p>23.0% Total Nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal Nitrogen 22.2% Urea Nitrogen*</p> <p>2.0% Available Phosphate (P₂O₅) from ammonium phosphate</p> <p>10.0% Soluble Potash (K₂O) from potassium sulfate</p> <p>4.8% Total Sulfur (S) from sulfur</p> <p>5.0% Iron (Fe) from ferric oxide</p> <p>*14.95% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>UK/EC</p> <p>EC FERTILISER NK FERTILISER WITH FE 23 + 0 + 10 + Fe</p> <p>23.0% Total Nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal nitrogen (N) 22.2% Ureic nitrogen (N)</p> <p>10.0% Potassium oxide (K₂O) water soluble</p> <p>12.0% Sulphur trioxide (SO₃) water soluble</p> <p>5.0% Iron (Fe)</p> <p>Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP</p> <p>Application Rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>Eire/EC</p> <p>EC FERTILISER NK FERTILISER WITH FE 23 + 0 + 8.3 + Fe</p> <p>23.0% Total nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal nitrogen (N) 22.2% Ureic nitrogen (N)</p> <p>8.3% Potassium (K) water soluble</p> <p>4.8% Sulphur (S) water soluble</p> <p>5.0% Iron (Fe)</p> <p>Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>France/EC</p> <p>ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC FE 23 + 0 + 10 + Fe</p> <p>23,0% Azote totale (N) 0,8% Azote ammoniacal (N) 22,2% Azote uréique (N)</p> <p>10,0% Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau</p> <p>12,0% Trioxyde de soufre (SO₃)</p> <p>5,0% Fer (Fe)</p> <p>Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.</p> <p>Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCCQ - France</p> <p>Taux d'application : 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS L'AVÉR À L'EAU. Entrepoiser dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.</p>																																	
<p>Deutschland/Österreich</p> <p>EC-DÜNGER NK-DÜNGER MIT EISEN 23 + 0 + 10 + Fe</p> <p>23,0 % N Gesamtstickstoff 0,8 % N Ammoniumstickstoff 22,2 % N Carbamidstickstoff</p> <p>10,0 % K₂O wasserlösliches Kaliumoxid</p> <p>4,8 % S Schwefel</p> <p>5,0 % Fe Eisen</p> <p>Nettogewicht: 20kg</p> <p>Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Harlboden 48, A-8101 Gratkorn</p> <p>Aufwandmenge: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-25 g/m² auf einem aktiv wachsenden, trockenen Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen austragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Nicht auf Übungsgrün verwenden. Dieses Produkt enthält Eisen, das Flecken auf Zement und anderen Oberflächen hinterlassen kann. Rasenpartikel sofort durch Weglegen oder -blasen entfernen, um Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen.</p>	<p>España/CE</p> <p>ABONO CE NK ABONO CON FE 23 + 0 + 10 + Fe</p> <p>23,0% Nitrógeno total (N) 0,8% Nitrógeno amoniacal (N) 22,2% de nitrógeno ureico (N)</p> <p>10,0% de óxido de potasio (K₂O) soluble en agua</p> <p>12,0% de azufre (SO₃) soluble en agua</p> <p>5,0% Hierro (Fe)</p> <p>Bajo en cloruro. Sólo debe utilizarse cuando hay una necesidad reconocida. No exceder las dosis adecuadas.</p> <p>Importador para España:</p> <p>Dosis de aplicación: 15-25 grs/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas a otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVIA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegurarse de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.</p>	<p>Italia</p> <p>FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NK CON FE 23 + 0 + 10 + Fe</p> <p>23,0% Totale azoto (N) 0,8% Azoto ammoniacale (N) 22,2% Azoto ureico (N)</p> <p>10,0% Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua</p> <p>12,0% Anidride solforica (SO₃) totale</p> <p>5,0% Ferro (Fe)</p> <p>Basso livello di cloruro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.</p> <p>Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera, 1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)</p> <p>Distribuito da: EMERALD s.r.l.</p> <p>Tassi di applicazione: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Indicazioni per l'uso: Applicare 15-25 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.</p>	<p>Sverige</p> <p>EC KONSTGÖSELMEDEL NK KONSTGÖSELMEDEL MED FE 23 + 0 + 8,3 + Fe</p> <p>23,0 % Totalt kväve (N) 0,8% Ammoniakkväve (N) 22,2% Ureakväve (N)</p> <p>8,3 % Kalium (K) vattenlösligt</p> <p>4,8 % Svavel (S)</p> <p>5,0 % Järn (Fe)</p> <p>Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstaterats att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.</p> <p>Importerar i Sverige av:</p> <p>Applikationsrater: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Bruksanvisningar: Produkten ska påföras i aktivt växande gräsjord med en dos av 15-25 g/m². Produkten ska påföras torr (råsvämning. Benvättning ska ske med 5-6 mm efter påförandet. Om temperaturen är högre än 25 °C eller om det inte går att tillföra produkten på fuktig eller våt mark, ska bevattning ske genast efter tillförandet. Tillstått i låga doser ifall temperaturen överskrider 25 °C. Får ej användas på green avsedd för putting. Denna produkt innehåller järn som kan fläcka ner betong och andra ytor. Avlägsna genast partiklar genom att sopa eller blåsa undan sådant som kan leda till missfärgning. FÅR EJ AVTVÄTAS MED VATTEN. Förvara produkten rent och torr. Återförslut en öppnad påse genom att vika ned och stänga påsen ovanparti. Använd endast rena och torra spridare. Önsvänd produkt får ej lämnas kvar i spridare.</p>																																	
<p>Norge</p> <p>EC KUNSTGJØSDEL NK KUNSTGJØSEL MED FE 23 + 0 + 8,3 + Fe</p> <p>23,0% Samlet nitrogen (N) 0,8% ammoniakalsk nitrogen (N) 22,2% urea-nitrogen (N)</p> <p>8,3% Kalium (K) vannoppløselig</p> <p>4,8% Svavel (S)</p> <p>5,0% Jern (Fe)</p> <p>Lavt kloridinnhold. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.</p> <p>Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING</p> <p>Applikasjonsrater: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Bruksanvisning: Anvend produktet på aktivt voksende gress i forholdet 15 til 25 g/m². Brukes på tørre gressstrå. Gresset varmes etter påføring - 5 til 6 mm med kunstig vannning. Hvis temperaturen er over 25 °C, eller hvis man ikke kan unngå å anvende produktet på fuktig eller vått gress, skal man varme ikke etter påføring. Anvend produktet langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke brukes på putting greens. Dette produktet inneholder jern som kan sette flekker på betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved å feie eller blåse for å unngå flekker. MÅ IKKE VASKES AV MED VANN. Oppbevares på et rent, tørt sted. Den åpne posen forsegles igjen ved å folde toppen ned og sikre den. Bruk kun rene, tørre spreder. Det må ikke la ubrukt produkt bli liggende igjen i en spredde.</p>	<p>Denmark</p> <p>EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING MED FE 23 + 0 + 8,3 + Fe</p> <p>23,0% Samlet kvælstof (N) 0,8% Ammoniumkvælstof (N) 22,2% Ureakvælstof (N)</p> <p>8,3% Kalium (K) vandopløseligt</p> <p>4,8% Svovl (S)</p> <p>5,0% Jern (Fe)</p> <p>Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.</p> <p>Importeret i Danmark af: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING</p> <p>Applikationsrater: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Bruksanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-25 g/m². Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvanding. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fuktig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Oppbevares et rent, tørt sted. Forsegel den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spreder. Der må ikke efterlades ubrukt produkt i en spredde.</p>	<p>België</p> <p>EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET FE 23 + 0 + 10 + Fe</p> <p>23,0% totaal stikstof (N) 0,8% ammoniakstikstof (N) 22,2% ureumstikstof (N)</p> <p>10,0% kaliumoxide (K₂O), in water oplosbaar</p> <p>12,0% zwaveltrioxide (SO₃)</p> <p>5,0% ijzer (Fe)</p> <p>Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.</p> <p>Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – België</p> <p>Aan te brengen hoeveelheden: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorstte deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.</p>	<p>Belgique</p> <p>ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC FE 23 + 0 + 10 + Fe</p> <p>23,0% Azote totale (N) 0,8% Azote ammoniacal (N) 22,2% Azote uréique (N)</p> <p>10,0% Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau</p> <p>12,0% Trioxyde de soufre (SO₃)</p> <p>5,0% Fer (Fe)</p> <p>Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.</p> <p>Importé en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique</p> <p>Taux d'application : 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS L'AVÉR À L'EAU. Entrepoiser dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.</p>																																	
<p>Greece</p> <p>23 + 2 + 10 + Fe</p> <p>23,0% Ολικό άζωτο (N) 0,8% Αμμωνιακό άζωτο 22,2% Άζωτο ουρίας*</p> <p>2,0% Διασέσιμα φωσφορούχα (P₂O₅) από φωσφορικό αμμώνιο</p> <p>10,0% Διαλυτή ποτάσσα (K₂O) από θειικό κάλιο</p> <p>4,8% Ολικό θείο (S) από θείο</p> <p>5,0% Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου</p> <p>*14,95% διαθέσιμο βραδέως άζωτο από πολυμερές επικάλυψη ουρίας επιχρισμένη με θείο.</p> <p>Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE</p> <p>Ρυθμοί εφαρμογής 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m². Εφαρμόστε σε ήπια φύλλωση. Πότιστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβεί τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κόψετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Μη χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting green». Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τοιμήτο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφυγείτε το λέκιασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζνα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς το κάτω και ασφαλιζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήστε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.</p>	<p>Taiwan (R.O.C.)</p> <p>23 + 2 + 10 + Fe</p> <p>23.0% Total Nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal Nitrogen 22.2% Urea Nitrogen*</p> <p>2.0% Available Phosphate (P₂O₅) from ammonium phosphate</p> <p>10.0% Soluble Potash (K₂O) from potassium sulfate</p> <p>4.8% Total Sulfur (S) from sulfur</p> <p>5.0% Iron (Fe) from ferric oxide</p> <p>*14.95% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>																																			
<p>Australia</p> <p>23 + 0.9 + 8.3 + Fe</p> <p>23.0% Total Nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal Nitrogen 22.2% Urea Nitrogen</p> <p>0.9% Phosphorus (P) from ammonium phosphate</p> <p>8.3% Potassium (K) from potassium sulfate</p> <p>4.8% Sulfur (S) from sulfate</p> <p>5.0% Iron (Fe) from ferric oxide</p> <p>*14.95% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.</p> <p>Application rates: 1.5-2.5 kg/100 m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100 m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>New Zealand</p> <p>23 + 0.9 + 8.3 + Fe</p> <p>23.0% Total Nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal Nitrogen 22.2% Urea Nitrogen</p> <p>0.9% Phosphorus (P) from ammonium phosphate</p> <p>8.3% Potassium (K) from potassium sulfate</p> <p>4.8% Sulfur (S) from sulfate</p> <p>5.0% Iron (Fe) from ferric oxide</p> <p>*14.95% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ground Speed</th> <th rowspan="2">Width of Coverage</th> <th colspan="3">Spreader Settings</th> </tr> <tr> <th>15 g/m²</th> <th>20 g/m²</th> <th>25 g/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Model 2000 & 2000 SR (cone 7) Settings for single pass application = FULL RATE</td> <td>5 km/hr</td> <td>3.7 m</td> <td>K 1/2</td> <td>M</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td> Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern III-B) Settings for single pass application = FULL RATE</td> <td>7 km/hr</td> <td>11.6 m</td> <td>4 1/2</td> <td>5</td> <td>5 1/2</td> </tr> <tr> <td>Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE</td> <td>7 km/hr</td> <td>9.1 m</td> <td>22</td> <td>26</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.</td> </tr> </tbody> </table>		Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	 Model 2000 & 2000 SR (cone 7) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.7 m	K 1/2	M	N	 Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern III-B) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	11.6 m	4 1/2	5	5 1/2	Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	9.1 m	22	26	30	Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Manufactured by: The Andersons, Inc. P.O. Box 119 Maumee, OH 43537 U.S.A. www.andersonsplantnutrient.com</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h1>25 kg/net</h1> <h2>APPG231FE5</h2> </div> </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; PolySports and NS-54 are trademarks of The Andersons, Inc.</p>
	Ground Speed	Width of Coverage				Spreader Settings																														
			15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²																															
 Model 2000 & 2000 SR (cone 7) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.7 m	K 1/2	M	N																															
 Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern III-B) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	11.6 m	4 1/2	5	5 1/2																															
Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	9.1 m	22	26	30																															
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.																																				