

PolySports™

SGN 240

28 + 3 + 10

(28 + 1.3 + 8.3)

50% NS-54™

USA/INT	28 + 3 + 10	UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER 28 + 0 + 10	Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER 28 + 0 + 8.3	France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK 28 + 0 + 10
28.0% Total Nitrogen (N) 1.17% Ammoniacal Nitrogen 26.83% Urea Nitrogen*	3.0% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate 10.0% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium chloride 1.30% Total Sulfur (S) from sulfur	28.0% Total Nitrogen (N) 1.2% Ammoniacal nitrogen (N) 26.8% Ureic nitrogen (N) 10.0% Potassium oxide (K ₂ O) water soluble Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP	28.0% Total nitrogen (N) 1.2% Ammoniacal nitrogen (N) 26.8% Ureic nitrogen (N) 8.3% Potassium (K) water soluble Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP	28.0% Azote totale (N) 1.2% Azote ammoniacal (N) 26.8% Azote uréique (N) 10.0% Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCOQ - France	*14.00% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea	Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Deutschland/Österreich EK-DÜNGEMITTEL NK-Dünger, 28-10 - Mischdünger	España/CE FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NK 28 + 0 + 10	Italia FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NK 28 + 0 + 10	Sverige EU GÖDSELMEDEL NK-gödselmedel med 50% låntidsverkande N 28-0-8 (28-3-10)
28,0 % N Gesamstickstoff 1,1 % N Ammoniumstickstoff 26,8 % N Carbamidstickstoff 10,0 % K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid Nettogewicht: 20 kg Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn Enthält auch: 3,0 % P ₂ O ₅ neutralammonicitrat- und wasserlösliches Phosphat 48 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt Aufwandmenge: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)	28,0% Nitrógeno total (N) 1,2% Nitrógeno amoniacal (N) 26,8% Nitrógeno ureico (N) 10,0% Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua Importado en España por: CESSVER VALENCIA,S.L. Plaza Antonio Cortis, 2B, 46013 Valencia - ESPAÑA Dosis de aplicación: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Instrucciones de uso: Aplique 15-25 g/m ² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.	28,0% Totale azoto (N) 1,2% Azoto ammoniacale (N) 26,8% Azoto ureico (N) 10,0% di ossido di potassio (K ₂ O), solubile in acqua Importato (fabricante) da: BOTTOS s.r.l. via Luverera, 1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Distribuito da: EMERALD s.r.l. Tassi di applicazione: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Indicazioni per l'uso: Applicare 15-25 g/m ² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.	28,0% Kväve (N) 1,2% ammonium-N 26,8% urea-N varav 14% från PCSCU 8,3% Kalium (K) 10,0% kaliumoxid (K ₂ O) Baserat på ammoniumfosfat, urea, polymer- och svaveläckt urea, liksom kaliumklorid. Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas. Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling NORGE Rekommenderad mängd: 15 – 25 g/m ² (150 – 250 kg/ha) Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25°C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödsel skal lagras tort.

Norge	NPK-gjødsel med 50% langsomt virkende N 28 – 1 – 8 (28-3-10)	Denmark EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING 28 + 0 + 8.3	België EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST 28 + 0 + 10	Belgique ENGRAIS EC ENGRAIS NK 28 + 0 + 10
28,0% Nitrogen (N) 1,2% ammonium-N 26,8% urea-N Ivorav 14% fra PCSCU 1,3% Fosfor (P) 3,0% fosforpentoksyd (P ₂ O ₅) 8,3% Kalium (K) 10,0% kaliumoksyd (K ₂ O) 1,3% Svovel (S) 8,5% Klor (Cl) Basert på ammoniumfosfat, urea, polymer- og svovelledket urea, samt kaliumklorid. Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides. Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling NORGE Reg. nr. (Mattilsynet): 3128 Anbefalte gjødselmengder: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Gjødsla tilføres når graset er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandene. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tort.	28,0% Samlet kvælstof (N) 1,2% Ammoniumkvælstof (N) 26,8% Ureakvælstof (N) 8,3% Kalium (K) vandoploseligt Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING Applikationsrater: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-25 g/m ² . Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påföringen med 5 to 6 mm kunstvanding. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påföringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Opbevares et rent, tørt sted. Foresgl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.	28,0% totaal stikstof (N) 1,2% ammoniakstikstof (N) 26,8% ureumstikstof (N) 10,0% kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – België Aan te brengen hoeveelheden: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m ² . Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroomachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroomachines verwijderen.	28,0% Azote totale (N) 1,2% Azote ammoniacal (N) 26,8% Azote uréique (N) 10,0% Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau Importation en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique Taux d'application : 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandouses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandouses.	

Greece	Taiwan (R.O.C.)	Australia	New Zealand
28,00% Ολικό Άζωτο (N) 1,17% Αμμωνιακό Άζωτο 26,83% Άζωτο από Ουρία 3,00% Διαθέσιμα Φωσφορικά (P ₂ O ₅) 10,00% Διαλυτό Κάλιο (K ₂ O) 1,30% Ολικό Θείο (S) 1,30% Ελεύθερο Θείο(S) Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωρονικός Οίκος 3 Makedonias St., Athens, GREECE Ρυθμοί εφαρμογής: 15-25g/m ² (150-250 kg/ha) Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m ² . Εφαρμόστε σε έρηνη φυλλωσία. Ποτίστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαινει τους 25°C η αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαινει τους 25°C. Μη χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting greens». Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ανα στραγγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς τις. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήσετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.	28.0% Total Nitrogen (N) 1.17% Ammoniacal Nitrogen 26.83% Urea Nitrogen* 3.0% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate 10.0% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium chloride 1.30% Total Sulfur (S) from sulfur *14.00% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea Application rates: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	28.0% Total Nitrogen (N) 1.2% Ammoniacal Nitrogen 26.8% Urea Nitrogen 1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate 8.3% Potassium (K) from potassium chloride 1.3% Sulfur (S) from sulfate *14.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea. Application rates: 1.5-2.5 kg/100 m ² (150-250 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	28.0% Total Nitrogen (N) 1.2% Ammoniacal Nitrogen 26.8% Urea Nitrogen 1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate 8.3% Potassium (K) from potassium chloride 1.3% Sulfur (S) from sulfate *14.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea. Application rates: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Australia	New Zealand
28.0% Total Nitrogen (N) 1.2% Ammoniacal Nitrogen 26.8% Urea Nitrogen 1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate 8.3% Potassium (K) from potassium chloride 1.3% Sulfur (S) from sulfate *14.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea. Application rates: 1.5-2.5 kg/100 m ² (150-250 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	28.0% Total Nitrogen (N) 1.2% Ammoniacal Nitrogen 26.8% Urea Nitrogen 1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate 8.3% Potassium (K) from potassium chloride 1.3% Sulfur (S) from sulfate *14.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea. Application rates: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings		
			15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²
Model 2000 & 2000 SR (cone 4) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.6 m	K 1/2	L 1/2	M 1/2
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-C) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	12.2 m	5 1/2	6	6 1/2
Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	9.7 m	30	33	36
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					

The
Andersons®

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

25 kg/net APPG2815