

# Tee Time®

## SGN 100

# 8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn

## (8 + 0 + 13.3 + Mg, Fe, Mn)

USA/INT	8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
8.0%	Total Nitrogen (N) 8.0% Ammoniacal Nitrogen
16.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
3.0%	Magnesium (Mg) from magnesium oxide
14.5%	Total Sulfur (S) from sulfate
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
5.0%	Manganese (Mn) from manganese oxide

**Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Mg, Fe, Mn 8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
8.0%	Total nitrogen (N) 8.0% Ammoniacal nitrogen (N)
16.0%	Potassium oxide (K <sub>2</sub> O) water soluble
5.0%	Magnesium oxide (MgO)
36.25%	Sulphur trioxide (SO <sub>3</sub> ) water soluble
2.0%	Iron (Fe)
5.0%	Manganese (Mn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Bandedth Industrial Estate  
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

**Application Rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Mg, Fe, Mn 8 + 0 + 13.3 + Mg, Fe, Mn
8.0%	Total nitrogen (N) 8.0% Ammoniacal nitrogen (N)
13.3%	Potassium (K) water soluble
3.0%	Magnesium (Mg)
14.5%	Sulphur (S) water soluble
2.0%	Iron (Fe)
5.0%	Manganese (Mn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Bandedth Industrial Estate  
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

**Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Mg, Fe, Mn 8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
	8,0% Azote totale (N) 8,0% Azote ammoniacal (N)
	16,0% Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
	5,0% Oxyde de magnésium (MgO)
	36,25% Trioxyde de soufre (SO <sub>3</sub> )
	2,0% Fer (Fe)
	5,0% Manganèse (Mn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.  
25 Rue de la Chapelle  
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

**Taux d'application : 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Mode d'emploi :** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-30 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandaises propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandaises.

Deutschland/Österreich	EC-DÜNGER NK-DÜNGER MIT MAGNESIUM, EISEN UND MANGAN 8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
8,0 %	N Gesamtstickstoff 8,0% N Ammoniumstickstoff
16,0 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
3,0 %	Mg Magnesium
14,5 %	S Schwefel
2,0 %	Fe Eisen
5,0 %	Mn Mangan

Nettogewicht: 20kg

Hersteller:  
Turf Handels GmbH, Am Harlboden 48, A-8101 Gratkorn

**Aufwandmenge: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Anwendungsempfehlung:** Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-30 g/m<sup>2</sup> auf einem aktiv wachsenden, trockenem Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das Flecken auf Zement und anderen Oberflächen hinterlassen kann. Restpartikel sofort durch Wegfegen oder -blasen entfernen, um Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. An einem sauberen, trockenem Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

España/CE	ABONO CE NK abono ce contenga Mg, Fe, Mn 8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
8,0%	Nitrógeno total (N) 8,0% Nitrógeno amoniacal (N)
16,0%	de óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua
5,0%	de óxido de magnesio (MgO)
36,25%	de azufre (SO <sub>3</sub> ) soluble en agua
2,0%	Hierro (Fe)
5,0%	Manganeso (Mn)

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando hay una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

**Dosis de aplicación: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 Kg/ha)**

**Instrucciones de uso:** Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas a otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas aspiradoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Italia	CONCIME CE Concime NK (S) 8–16 (36,2) contenente Azoto ammoniacale a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione
Azoto (N) totale	8 %
di cui Azoto (N) ammoniacale	8 %
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	16 %
Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua	36,25 %
Magnesio (MgO)	5 %
Ferro (Fe)	2 %
Manganese (Mn)	5 %

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.  
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

**Dose: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Istruzioni per l'uso:** Applicare 15-30 gr/mq di prodotto su manto erboso asciutto in crescita. Irrigare dopo l'applicazione con 5-6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25 °C applicare a dosaggi bassi e irrigare immediatamente. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigliare il sacchetto aperto piegando ed asciugando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti e asciutti. Non lasciare prodotto inusato negli spargitori.

Norge	NK-gjødsel med Mg og Mn 8 – 0 – 13 (8 – 0 – 16)
8,0%	Nitrogen (N) 8,0% ammonium-N
13,3%	Kalium (K) 16,0% kaliumoksyd (K <sub>2</sub> O)
3,0%	Magnesium (Mg)
14,5%	Svovel (S)
2,0%	Jern (Fe)
5,0%	Mangan (Mn)

Basert på ammonium- og kaliumsulfat, jern- og manganoksyd, samt magnesiumoksyd.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 Dilling, NORGE  
Reg. nr. (Mattilsynet): 3253

**Anbefalte gjødselmengder: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

Gjødsla tilføres når gras er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å løse opp gjødselkornene. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25 °C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feiling eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspreder. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsel skal lagres tørt.

Denmark	NK-kunstgøding med Mg og Mn 8 – 0 – 13 (8 – 0 – 16)
8,0%	Kvælstof (N) 8,0% ammonium-N
13,3%	Kalium (K) 16,0% kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)
3,0%	Magnesium (Mg)
14,5%	Svovl (S)
2,0%	Jern (Fe)
5,0%	Mangan (Mn)

Basert på ammonium- og kaliumsulfat, jern og manganoksid og magnesiumoksid.

Må kun bruges til idkunderterede behov for golf- og fodboldbaner, parker og haver. De anbefalede mængder må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 DILLING, NORGE

**Applikationsrater: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Brugsanvisninger:** Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-25 g/m<sup>2</sup>. Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvandning. Hvis temperaturen er over 25 °C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæse for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsøgl dem åbne pose igen ved at holde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredet.

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET Mg, Fe, Mn 8 + 0 + 16,0 + Mg, Fe, Mn
8,0%	totaal stikstof (N) 8,0% ammoniakstikstof (N)
16,0%	kaliumoxide (K <sub>2</sub> O), in water oplosbaar
5,0%	magnesiumoxide (MgO)
36,25%	zweveltrioxide (SO <sub>3</sub> )
2,0%	ijzer (Fe)
5,0%	mangaan (Mn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba  
Lorkenlaan 14  
2950 Kapellen – België

**Aan te brengen hoeveelheden: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Gebruiksaanwijzing:** Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m<sup>2</sup>. Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorstte deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Mg, Fe, Mn 8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
	8,0% Azote totale (N) 8,0% Azote ammoniacal (N)
	16,0% Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
	5,0% Oxyde de magnésium (MgO)
	36,25% Trioxyde de soufre (SO <sub>3</sub> )
	2,0% Fer (Fe)
	5,0% Manganèse (Mn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba  
Lorkenlaan 14  
2950 Kapellen – Belgique

**Taux d'application : 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Mode d'emploi :** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 20-35 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandaises propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandaises.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
8,0%	Ολικό άζωτο (N) 8,0% Αμμωνιακό άζωτο
16,0%	Διαλυτή πάστασα (K <sub>2</sub> O) από θειικό κάλιο
3,0%	Μαγνήσιο (Mg) από οξείδιο του μαγνησιού
14,5%	Ολικό θείο (S) από θειικό
2,0%	Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου
5,0%	Μαγγάνιο (Mn) από θειικό μαγγάνιο

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos  
3 Makedonias St., Athens, GREECE

**Ρυθμοί εφαρμογής 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Οδηγίες χρήσης:** Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m<sup>2</sup>. Εφαρμόστε σε ήπια ψύλλωση. Πότιστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνει την εφαρμογή σε υψηλότερο ή υψηρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ζεπτερνούν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τοιμέτο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα αυτομάτδια αμέσως με σκούπισμα ή ψύγμα για να αποφευχete το λέκιασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να γανω σφραγιζέτε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)	8 + 0 + 16 + Mg, Fe, Mn
8.0%	Total Nitrogen (N) 8.0% Ammoniacal Nitrogen
16.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
3.0%	Magnesium (Mg) from magnesium oxide
14.5%	Total Sulfur (S) from sulfate
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
5.0%	Manganese (Mn) from manganese oxide

**Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Australia	8 + 0 + 13.3 + Mg, Fe, Mn
8.0%	Total Nitrogen (N) 8.0% Ammoniacal Nitrogen
13.3%	Potassium (K) from potassium sulfate
1.8%	Magnesium (Mg) from magnesium oxide
14.5%	Sulfur (S) from sulfate
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
5.0%	Manganese (Mn) from manganese oxide



**Application rates: 1.5–3.0 kg/100 m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**


**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 kg/100 m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	8 + 0 + 13.3 + Mg, Fe, Mn
8.0%	Total Nitrogen (N) 8.0% Ammoniacal Nitrogen
13.3%	Potassium (K) from potassium sulfate
1.8%	Magnesium (Mg) from magnesium oxide
14.5%	Sulfur (S) from sulfate
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
5.0%	Manganese (Mn) from manganese oxide

**Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

 <b>Spreaders</b> 	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m <sup>2</sup>	20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>
<b>Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	5 km/hr	3.0 m	I 3/4	J 3/4	L	M
<b>SS-2 Drop Spreader</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	7 km/hr	0.9 m	3 1/2	4 1/4	5	5 3/4
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						



The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.

Manufactured by:  
The Andersons, Inc.  
P.O. Box 119  
Maumee, OH 43537  
U.S.A.  
www.andersonspantrnutrient.com

# 20 kg/net

# APPG8M4