

Nutri DG®

Greens - SGN 75

9 + 0 + 18 + Fe, Mn

(9 + 0 + 14.9 + Fe, Mn)

65% MUtech™

| USA/INT | 9 + 0 + 18 + Fe, Mn |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0% | Total Nitrogen (N) 3.2% Ammoniacal Nitrogen 0.9% Urea Nitrogen 2.9% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas |
| 18.0% | Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate |
| 6.1% | Total Sulfur (S) from sulfate |
| 0.3% | Iron (Fe) water soluble from iron sulfate |
| 6.0% | Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate |

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| Deutschland/Österreich | EC-DÜNGER NK-DÜNGER MIT HARNSTOFF-FORMALDEHYD MIT Mn 9 + 0 + 18 + Mn |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0% | Gesamtstickstoff (N) 3,2% Ammoniumstickstoff (N) 0,9% Harnstoffstickstoff (N) 5,0% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd mit 2,9% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd, löslich nur in kaltem Wasser 1,1% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd, löslich nur in heißem Wasser |
| 18,0% | Kaliumoxid (K ₂ O), wasserlöslich |
| 15,3% | Schwefeltrioxid (SO ₃), wasserlöslich |
| 6,0% | Mangan (Mn), wasserlöslich |

Geringer Chloridgehalt. Nur bei Vorhandensein eines anerkannten Bedarfs zu verwenden. Die anwendbaren Dosistraten nicht überschreiten.

Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH, Am Harbuden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)
Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-30 g/m² auf einem aktiv wachsenden, trockenem Rasen ausstreuen. Sofort nach der Ausbringung mindestens 5 mm Wasser versprühen, damit sich die Partikel in der Wurzelzone verteilen und auflösen. Aufgrund von Schwankungen bzgl. Temperatur und pH-Gehalt des Wassers sollte die Bewässerung zweimal in einem Abstand von 10-15 Minuten stattfinden. Auf diese Weise können sich die Partikel in der Wurzelzone gründlicher verteilen. Die Partikelgröße kann je nach Produktcharge anders ausfallen. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das auf Beton und anderen Oberflächen Flecken hinterlassen kann. Zurückgeliebene Partikel sofort wegsaugen oder bläsen, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. **NICHT MIT WASSER ABWASCHEN.** Ein einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

| Norge | NK-gjødsel med Fe og Mn 9 – 0 – 15 (9 – 0 – 18) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0% | Nitrogen (N) 3,2% ammonium-N 0,9% urea-N 4,9% ureaformaldehyd hvorav 2,9 % langsomtvirkende N fra metylenurea |
| 14,9% | Kalium (K), vannløselig 18,0% kaliumoksyd (K ₂ O) |
| 6,1% | Svovel (S), vannløselig |
| 0,3% | Jern (Fe), vannløselig |
| 6,0% | Mangan (Mn), vannløselig |

Basert på ammoniumsulfat, urea, metylenurea, kaliumsulfat, samt jern- og mangansulfat. Skal bare benyttes ved påvist behov. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS, Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORWAY

Anbefalte gjødselmengder: 15 – 30 g/m² (150 – 300 kg/ha)

Gjødsla tilføres når grasset er i vekst, og på tørt bladverk. Umiddelbart etter påføring, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispersere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vanning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og varm øyeblikkelig for å unngå sving. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feing eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsla skal lagres tørt.

| España/CE | ABONO CE ABONO COMPLEJO Abono NK contenido urea formaldehido CON Mn 9 + 0 + 18 + Mn |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0% | Nitrógeno total (N) 3,2% Nitrógeno amoniacal (N) 0,9% de nitrógeno ureico (N) 5,0% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehido 2,9% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehido soluble en agua fría 1,1% Nitrógeno (N) de la urea formaldehido soluble únicamente en agua caliente |
| 18,0% | de óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua |
| 15,2% | de azufre (SO ₃) soluble en agua |
| 6,0% | Manganeso (Mn) soluble en agua |

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15-30 grs. / m² (150-300 Kg. / ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Dosis recomendada 15-30 gr./m². Aplicar cuando la hierba este seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplicar un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si la temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.

| Australia | 9 + 0 + 14.9 + Fe, Mn |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0% | Total Nitrogen (N) 3.2% Ammoniacal Nitrogen 0.9% Urea Nitrogen 2.9% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas |
| 14.9% | Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate |
| 6.1% | Total Sulfur (S) from sulfate |
| 0.3% | Iron (Fe) water soluble from iron sulfate |
| 6.0% | Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate |

Application rates: 1.5 - 3.0 kg/100 m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5 - 3.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| UK/EC | EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn 9 + 0 + 18 + Mn |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0% | Total nitrogen (N) 3.2% Ammoniacal nitrogen (N) 0.9% Ureic nitrogen (N) 5.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 2.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water |
| 18.0% | Potassium oxide (K ₂ O) water soluble |
| 15.3% | Sulphur Trioxide (SO ₃) water soluble |
| 6.0% | Manganese (Mn) water soluble |

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd, Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate, Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| Denmark | EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREA-FORMALDEHYD MED Mn 9 + 0 + 14.9 + Mn |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0% | Samlet kvælstof (N) 3,2% Ammoniumkvælstof (N) 0,9% Ureakvælstof (N) 5,0% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med 2,9% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand 1,1% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand |
| 14,9% | Kalium (K) vandopløseligt |
| 6,1% | Svovl (S) vandopløseligt |
| 6,0% | Mangan (Mn) vandopløseligt |

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende doserater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS, Gullfunnet 50, 1570 DILLING

Applikationsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)
Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-30 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispersere partikler i rotzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rotzonen. Partikkel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringssmængden, hvis temperaturen overskrider 25 °C og overrød umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at fejle eller blæse for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et tørt, tørt sted. Forsølg den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.

| Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31 | 9 + 0 + 18 + Fe, Mn |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9% | Ολικό άζωτο (N) 3,2% Αμμωνιακό άζωτο 0,9% Άζωτο ουρίας 2,9% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθελκίνου 2,0% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίας μεθελκίνου |
| 18% | Διαλυτή ποτάσα (K ₂ O) από θειικό κάλιο |
| 6,1% | Ολικό θείο (S) από θειικό άλας |
| 0,3% | Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός από θειικό σίδηρο |
| 6,0% | Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό από θειικό μαγγάνιο |

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-30 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερού για να διαλυθεί τα σωματίδια στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζεται την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τιμιέριο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή ψύξη για να απορριχτεί το λέκασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να είναι ασφαλιστεί τις ανοιχτές σακούλες διαλύοντας το πάκτο μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

| Taiwan (R.O.C.) | 9 + 0 + 18 + Fe, Mn |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0% | Total Nitrogen (N) 3.2% Ammoniacal Nitrogen 0.9% Urea Nitrogen 2.9% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas |
| 18.0% | Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate |
| 6.1% | Total Sulfur (S) from sulfate |
| 0.3% | Iron (Fe) water soluble from iron sulfate |
| 6.0% | Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate |

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| New Zealand | 9 + 0 + 14.9 + Fe, Mn |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0% | Total Nitrogen (N) 3.2% Ammoniacal Nitrogen 0.9% Urea Nitrogen 2.9% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas |
| 14.9% | Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate |
| 6.1% | Total Sulfur (S) from sulfate |
| 0.3% | Iron (Fe) water soluble from iron sulfate |
| 6.0% | Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate |

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| Eire/EC | EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn 9 + 0 + 14.9 + Mn |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0% | Total nitrogen (N) 3.2% Ammoniacal nitrogen (N) 0.9% Ureic nitrogen (N) 5.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 2.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water |
| 14.9% | Potassium (K) water soluble |
| 6.1% | Sulphur (S) water soluble |
| 6.0% | Manganese (Mn) water soluble |

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd, Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate, Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| Italia | CONCIME CE Concime NK (S) 9-18 (6,1) contenente urea formaldeide a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azoto (N) totale | 9% |
| di cui Azoto (N) ammoniacale | 3,2% |
| di cui Azoto (N) ureico | 0,9% |
| di cui Azoto (N) dell'urea formaldeide | 5,0% |
| di cui Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda | 2,9% |
| di cui Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda | 2,1% |
| Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua | 18% |
| Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua | 6,1% |
| Ferro (Fe) | 0,3% |
| Manganese (Mn) | 6% |

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l., via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15-30 g/mq (150-300 kg/ha)
Indicazioni per l'uso: applicare 15-30 gr/mq di prodotto su manto erboso asciutto in crescita. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25 °C applicare a dosaggi bassi e irrigare immediatamente. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed asciugando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti e asciutti. Non lasciare prodotto inusato negli spargitori.

| België | EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET UREUM-FORMALDEHYDE; BEVAT Mn 9 + 0 + 18 + Mn |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0% | totaal stikstof (N) 3,2% ammoniakstikstof (N) 0,9% urea-stikstof (N) 5,0% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 2,9% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 1,1% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water |
| 18,0% | kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar |
| 15,3% | zwaveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar |
| 6,0% | mangaan (Mn), in water oplosbaar |

Laag chlooridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba, Lorkeilaan 14, 2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-30 g/m². Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm irwateren om deeltjes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variaties in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenpoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltjes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltjes kan van partij tot partij variëren. Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gevoest deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Gevoende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroomachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroomachines verwijderen.

| France/EC | ENGRAIS NK CONTENANT DE L'UREE FORMALDEHYDE AVEC DU Mn 9 + 0 + 18 + Mn |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0% | Azote (N) total 3.2% Azote (N) ammoniacal 0.9% Azote (N) uréique 5.0% Azote (N) de l'urée formaldehyde dont 2.9% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau froide 1.1% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau chaude |
| 18.0% | Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau |
| 15.3% | Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau |
| 6.0% | Manganèse (Mn) soluble dans l'eau |

Pauvre en Chlore. A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba, Lorkeilaan 14, 2950 Kapellen - Belgique

Taux d'application : 15 à 30 g/m² (150 à 300 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit à la dose de 15 à 30 grammes par m² pour obtenir une croissance optimale du gazon. Appliquer par temps sec et sur un feuillage sec. Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5 mm d'eau pour disperser les particules dans la zone de racines. En raison des variations de température et du pH de l'eau, les meilleurs résultats sont obtenus en divisant l'irrigation en 2 applications à 10-15 minutes d'écart. Ceci permettra une plus grande dispersion des particules dans la zone des racines. La couleur des particules peut varier d'un lot à un autre. En cas de chaleur supérieure à 25°C, minorer la dose et arroser immédiatement après application. Ce produit contient du fer qui peut tacher le béton et les autres surfaces dures ou poreuses. En cas d'application accidentelle sur ces surfaces, nettoyer en brossant ou soufflant afin d'éviter les taches. NE PAS NETTOYER AVEC DE LEAU. Conservier le produit dans un endroit propre et sec. Refermer soigneusement le sac en repliant la partie supérieure et en l'attachant. Appliquer avec un épandeur propre et sec. Ne pas laisser de produit inutilisé dans les épandeurs.

| Spreaders | Ground Speed | Width of Coverage | Spreader Settings | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) | Settings for single pass application = FULL RATE | | 15 g/m ² | 20 g/m ² | 25 g/m ² | 30 g/m ² |
| SSD Drop Spreader - Settings for single pass application = FULL RATE | | | 5 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 1/4 |

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.



The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.

| Sverige | EG-GÖDSELMEDEL NK-GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER UREA FORMALDEHYD MED Mn 9 + 0 + 14,9 + Mn |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0% | Total andel kväve (N) 3,2% Ammoniakväve (N) 0,9% Kväve (N) som urea 5,0% Urea Formaldehyd 2,9% från urea-formaldehyd endast lösligt i kallt vatten 1,1% från urea-formaldehyd endast lösligt i varmt vatten |
| 14,9% | Kalium (K) vattenlösigt |
| 6,1% | Svavel (S) vattenlösigt |
| 6,0% | Mangan (Mn) vattenlösigt |

Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB, c/o Floratine Norge AS, Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORGE

Dosering: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)